

4. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 13.03.2023 10:12 - Zaključeno



Na sončnih legah in lahkih tleh, kjer so breskve in nektarine že dosegle fenološko fazo odprtega brsta (BBCH 53) in prehajajo v fenološko fazo D (BBCH 55), pri vegetativnih brstih pa so **vidni zeleni listni vršički (BBCH 09) pred napovedanimi padavinami preventivno poškropite breskve in nektarine proti breskovi kodravosti** s pripravkom **Syllit 400 SC** (2,25 L/ha). Pripravek Syllit 544 SC (1,65 L/ha), ki je prav tako registrirana za zatiranje breskove kodravosti ni v prodaji.

Na lokacijah, kjer breskev in nektarine še niso dosegle faze odprtega brsta in pri vegetativni brsti **še ni vidnih zelenih listnih vršičkov, škropljenje proti breskovi kodravosti kot tudi luknjičavosti koščičarjev še vedno lahko opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra**, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

V primeru, da so jutranje temperature pod lediščem, škropljenje opravite, ko se temperature dvignejo nad ledišče. Škropljenje z bakrovimi pripravki pri temperaturah pod 0 °C lahko povzroča ožige.

Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za dobro omočenost celotne površine dreves.

Pred uporabo pripravkov preberite navodila za uporabo in jih dosledno upoštevajte.

Za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo, listno luknjičavostjo koščičarjev in breskovo pepelovko je v letošnjem letu pridobilo dovoljenje za nujne primere sredstvo CURATIO žvepleno apnena brozga, ki se uporabi v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.

OPOZORILO: Sredstvo smejo uporabljati le poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo!

Datum objave obvestila: 13.03.2023 10:12

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

