

6. VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC - 13.03.2023 13:41 - Zaključeno



Toplo vreme je spodbudilo aktivnost prezimelih stadijev češpljevega kaparja v nasadih ameriških borovnic. Pridelovalcem svetujemo naj pregledujejo nasade in bodo pozorni na morebitne premikajoče se ličinke, predvsem na starem lesu. V primeru opaženih ličink opravite škropljenje z enim izmed oljnih pripravkov. Uporabite lahko **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat/razpršilka** ali **Ovitex**. S pripravkom **Ovitex** se ne sme tretirati najmanj 30 dni po uporabi pripravkov na osnovi žvepla. Delovanje olj je najučinkovitejše v toplem (nad 10°C) in oblačnem vremenu. V primeru negativnih nočnih temperatur s škropljenjem še počakajte.

Nekateri nasadi ameriških borovnic na toplih legah že brstijo. Za zatiranje glivičnih in bakterijskih bolezni je v tem času priporočljiva uporaba registriranih sredstev na osnovi bakra (**Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP**). Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami vendar le primeru pozitivnih dnevnih (nad 8°C) in nočnih temperatur.

Na hladnih legah kjer so ameriške borovnic še v mirovanju, lahko uporabite sredstvo **Curatio apneno žveplena brozga**, ki je pridobilo dovoljenje za nujne primere, za uporabo v ekoloških nasadih. Sredstvo je dovoljeno uporabiti v obdobju med **15.03.2023 do 14.07.2023** za varstvo pred okužbami z antraknozo in boleznimi lesa in skorje.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in veljavne registracije!

Datum objave obvestila: 13.03.2023 13:41

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

