



19. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 25.03.2023 18:26 - Zaključeno



Brsti jablovan so na prehodu iz mišjega ušesca v stadij zelenih cvetnih popkov (54 – 56 po BBCH). Hruške so bolj razvite, v stadiju zelenih do rožnatih popkov, na zgodnjih legah tudi v balonskem stadiju (56 – 57 po lestvici BBCH).

V pričakovanju prvih možnih okužb z **jablanovim škrlupom** svetujemo preventivno varstvo z enim od naslednjih pripravkov: **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha; ni ga priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji), **MERPLUS** (2 l/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha). Pripravke kot so: **REYVONA** (1,3 l/10.000 m² tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha), **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l/10.000 m² tretirane listne površine; ne meša se z mineralnimi olji), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **FABAN** (1,2 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje, bomo umestili v varstvo kasneje, ko bo nevarnost za okužbe večja. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred *jablanovim škrlupom*, *listnimi pegavostmi*, *jablanovo pepelovko* in *sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov*), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Proti **jablanovi pepelasti plesni** dodajte 3 do 5 kg(l)/ha žveplovih sredstev.

Na površinah, kjer ste ugotovili presežen prag škodljivosti napada **jablanovega cvetožera** (pri slabem cvetnem nastavku 15%, oz. pri zelo dobrem nastavku do 30% napadenih brstov) lahko do stadija mišjega ušesca (54 po lestvici BBCH) uporabite **ASSET FIVE** (0,064 % konc., oz. 0,96 l v 1500 l vode na ha; s sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat; nevaren je za čebele), ki ima dovoljenje za nujne primere varstva rastlin. Škoda se stopnjuje v situacijah, ko nastopijo vremenske ohladi, ki upočasnijo razvoj dreves, kar vodi v daljšo izpostavljenost napadov. Ukrepanje je upravičeno le na osnovi opazovanja.

Pred cvetenjem svetujemo tudi varstvo pred **mokasto jablanovo ušjo** (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov) s pripravkom: **TEPPEKI, AFINTO** (oba 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l/ha na višinski meter krošnje) ali **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje še na **krvavo uš**, **sadnega listnega duplinarja**, **jabolčno grizlico**, **bolšice**, **škržate** in je dovoljen za ekološko pridelavo.

Pridelovalce opozarjamo na primeren čas za nameščanje **feromonskih razpršilcev za metodo zbeganja**. Razpršilce (ISOMATE C TT, RAK 3, CHECKMATE PUFFER CM-PRO, SemiosNET-Codling Moth) je potrebno v nasadu namestiti pred začetkom leta **jabolčnega zavijača**, kar sovpada s časom začetka cvetenja.

V nasadih hrušk, ki so močnejše napadeni s **hruševno bolšico**, oz. v nasadih jablane z **ameriškim kaparjem** lahko pred cvetenjem uporabite tudi pripravek **HARPUN** (1 l/ha proti **hruševi bolšici**; 0,5 l/ha proti **ameriškemu kaparju**). Pri tem pazite na varstvo čebel!

Še vedno opozarjamo na potrebno odstranjevanje dreves napadenih s strani **vrtnih zavrtčev**. Hroščki iz skupine podlubnikov so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo **alkoholnih pasti** (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola). Več informacij najdete v video posnetku: <https://www.youtube.com/watch?v=B7nL3GpqEsw&t=147s>.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 25.03.2023 18:26

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

