

12. VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ, ČEŠPELJ IN SLIV - 30.03.2023 07:59 - Zaključeno



V času cvetenja češenj, višenj, češpelj in sliv, je pred padavinami, potrebno cvetove zaščititi pred okužbami s cvetno monilijo. Uporabite lahko enega izmed fungicidnih sredstev **Amylo-X**, **Luna experience**, **Prestop**, **Prolectus**, **Revyona**, **Serenade aso**, **Signum**, **Switch 62,5 WG**, **Zenby**, **Tegro** in **Duaxo koncentrat**, **Teldor SC 500** (češnje in višnje) ter **Chorus 50 WG** (slive in češplje). Škropljenje je potrebno opraviti, ko bo odprtih 10 % cvetov.

V nasade češpelj in sliv je v času cvetenja potrebno obesiti bele lepljive plošče s katerimi spremljamo prisotnost rumene in črne češpljeve grizlice (2 plošči /ha). Če je po koncu cvetenja ulovljenih več kot 30 osic, je po končanem cvetenju potrebno opraviti škropljenje z insekticidom **Mospilan 20 SG**.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte. Pri nanosom sredstev nevarnih čebelarjem obvezno odstranitev cvetoče podrast in škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih.

Pripravili: David Snoj,
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 30.03.2023 07:59

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

[Seznam registriranih FFS](#)

