



26. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 03.04.2023 08:06 - Zaključeno



Brsti jablovan so v stadiju rožnatih cvetnih popkov (56 – 57 po BBCH). Hruške so bolj razvite, večinoma še v balonskem stadiju (59 po lestvici BBCH).

Spremenljivo vreme z občasnimi padavinami zvišuje možnost primarnih okužb z **jablanovim škrlupom**. Priporočamo preventivno varstvo z enim od naslednjih pripravkov: **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha; ni ga priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji). V kolikor bo zaščitna obloga v primeru daljših padavin izprana, svetujemo pripravke: **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **REYONA** (1,3 l/10.000 m² tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION 450 SC** (0,7-1,0 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **FABAN** (1,2 l/ha), **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l/10.000 m² tretirane listne površine; ne meša se z mineralnimi olji), ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred *jablanovim škrlupom*, *listnimi pegavostmi*, *jablanovo pepelovko* in *sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov*), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Proti *jablanovi pepelasti plesni* dodajte 3 do 5 kg(l)/ha **ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV**.

V nasadih hrušk, ki so močnejše napadeni s *hruševo bolšico*, oz. v nasadih jablovan z *ameriškim kaparjem* je pred cvetenjem potrebno uporabiti **HARPUN** (1 l/ha proti *hruševi bolšici*; 0,5 l/ha proti *amerškemu kaparju*). Pri tem pazite na varstvo čebel!

Pred cvetenjem svetujemo tudi varstvo pred *mokasto jablovano ušjo* (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov) s pripravkom: **TEPPEKI**, **AFINTO** (oba 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l/ha na višinski meter krošnje) ali **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje še na *krvavo uš*, *sadnega listnega duplinarja*, *jabolčno grizlico*, *bolšice*, *škržate* in je dovoljen za ekološko pridelavo.

Pridelovalce opozarjamo na primeren čas za nameščanje **feromonskih razpršilcev za metodo zbeganja**. Razpršilce (**ISOMATE C TT**, **RAK 3**, **CHECKMATE PUFFER CM-PRO**, **SemiosNET-Codling Moth**) je potrebno v nasadu namestiti pred začetkom leta *jabolčnega zavijača*, kar sovpada s časom začetka cvetenja.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 03.04.2023 08:06

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

