

30. VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ - 03.04.2023 08:13 - Zaključeno



Nasadi sliv in češpelj cvetijo (62 – 65 po lestvici BBCH).

V obdobju deževnega vremena svetujemo varstvo **pred cvetno monilijo**. Svetujem dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo sredstva: **AMYLO-X** (1,5 do 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha), **LIBRETO** (1,5 l/ha), **PRESTOP** (2 kg/ha), **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), **SWITCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Ob cvetenju je potrebno spremljati nalet **češpljevih grizlic (rumene in črne)**. V nasade namestite **bele lepljive plošče** (2 na ha). Prag škodljivosti je ob zaključenem cvetenju 30 ulovljenih osic. Takrat plošče iz nasada odstranite in v primeru preseženega praga ukrepate z **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.; oz. 4 g na 10 l vode).

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 03.04.2023 08:13

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

