



40. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 14.04.2023 13:43 - Zaključeno



Brsti jablovan so v stadiju balona, zgodnje sorte cvetijo (59 – 63 po BBCH). Hruške cvetijo (62 – 65 po lestvici BBCH).

Deževno vreme zvišuje možnost primarnih okužb z **jablanovim škrlupom**. Po prenehanju padavin bo potrebno zaščitno oblogo obnoviti, saj jo je trenutna količina dežja že izprala. V razmerah z nižjimi temperaturami in dolgo omočenostjo listne površine pridejo v poštev sredstva kot so: **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **BATALION 450 SC** (0,7-1,0 l/ha), **FABAN** (1,2 l/ha), **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l / 10.000 m² tretirane listne površine). Ostali pripravki z delnim zdravilnim delovanjem so še: **REYONA** (1,3 l/10.000 m² tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; *deluje tudi na jablanovo pepelovko*), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha; ni ga priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji). V kolikor vam med krajšo prekinitevjo dežja razmere omogočajo nanos preventivno delujočih **POLYRAM DF** (2 kg/ha) ali **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), izkoristite to priložnost. Sicer bo potrebno takoj po zaključku padavin uporabiti enega od pripravkov z daljšim kurativnim delovanjem: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha),... Opozorjamo, da pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi intenzivnost prirasta nove listne površine, s čimer naj razmiki v tem obdobju ne bodo daljši od 7 dni. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENABROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred *jablanovim škrlupom*, *listnimi pegavostmi*, *jablanovo pepelovko* in *sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov*), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrojen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Pri občutljivih sortah na *jablanovo pepelovko* ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) svetujemo v teh razmerah **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (2 l/ha;). Vsi navedeni delujejo tudi na *jablanov škrlup*.

Z začetkom cvetenja svetujemo namestitev **belih lepljivih plošč** za spremljanje *jabolčne grizlice*. V primeru preseženega praga škodljivosti (30 osic na ploščo), boste ukrepali po zaključenem cvetenju.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 14.04.2023 13:43

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

