

45. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 21.04.2023 13:12 - Zaključeno



Med tem, ko marelice in breskve oblikujejo plodiče, s cvetenjem zaključujejo tudi češnje in slive.

Pred naslednjimi padavinami je pri koščičastih sadnih vrstah, ki zaključujejo cvetenje, potrebno opraviti še zadnje tretiranje proti **cvetni moniliji**. V ta namen lahko uporabite **AMYLO-X** (1,5 do 2,5 kg/ha), **LIBRETO** (0,5 l/ha na meter višine krošnje, oz. 1,5 l/ha), **PRESTOP** (2 kg /ha), **PROLECTUS** (330 g/ha na višinski meter krošnje), **REYONA** (1,8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha; deluje tudi proti *listni luknjičavosti koščičarjev*), **ZENBY** (0,9 l/ha), **SWITCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha; tudi proti *listni luknjičavosti koščičarjev*), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (0,6 l/ha, oz. 1,1 l na višinski meter krošnje; češnje), **TELDOR SC 500** (0,5 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 1,5 l/ha; češnje), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha; slive in češplje),...

Tudi **CURATIO žvepleno apnena brozga** (6 l/ha na meter višine krošnje) deluje proti **monilijam** ter na breskvah in marelicah **listni luknjičavosti koščičarjev** ter **marelični, oz. breskovi pepelovki**.

Tretiranja proti **pepelovkam** svetujemo preventivno, po zaključenem cvetenju, s pripravki na osnovi žvepla: **AZUMO WG** (do 7,5 kg/ha), **BIOTIP SULFO 800 SC** (6 l/ha), **KUMULUS DF** (5 do 7,5 kg/ha), **MICROTHIOL DISPERS / SPECIAL** (5 do 7,5 kg/ha), **PEPELIN WG** (5 do 7,5 kg/ha), **SULFAR** (5 do 7,5 kg/ha), **THIOMT JET** (5 do 7,5 kg/ha), **VERTIPIN** (5 l/ha), **VINDEX 80 WG** (5 do 7,5 kg/ha). Za povečanje odpornosti in delno zmanjševanje okužb pride v poštev še **FYTOSAVE** (2 l/ha). V primeru močnejših okužb pa uporabite **SERCADIS** (0,15 l/ha).

Prislivah in češpljah bodite ob zaključevanju cvetenja pozorni na ulov osic **češpljevih grizlic** na belih lepljivih ploščah. Prag škodljivosti je 30 ulovljenih osebkov. V primeru preseženega praga škodljivosti, po zaključenem cvetenju, ukrepajte z **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % koncentracija). Sredstvo je nevarno za čebele in druge koristne organizme.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Priprava: Domen Bajec in Iva Imperl

Datum objave obvestila: 21.04.2023 13:12

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

