



27. ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU - 24.04.2023 12:49 - Zaključeno



Glavnina krompirjevih njiv je posajenih. Pred vznikom rastlin je primeren čas za zatiranje plevelov s talnimi herbicidi. Po dežju, ko so tla dobro sesedena in namočena, lahko za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov uporabite katerega od pripravkov v spodnji tabeli. **Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!**

Herbicide	Odmerek L, kg/ha	Aktivna snov	Opombe
Raba pred vznikom krompirja			
Stomp Aqua	2,9	pendimetalin	- škropiti po sajenju, ko se tla sesedejo - za zatiranje enoletnih ozkolistnih in nekaterih širokolistnih plevelov - za dobro učinkovitost je potrebna zadostna talna vlaga!
Sharpen 33 EC	3-5		
Sharpen plus 40 SC	2,5-4		
Stallion sync tec	3	pendimetalin + klomazon	- škropiti čimprej po sajenju, ko se tla sesedejo - ni za semenski krompir!
Boxer	5	prosulfokarb	zadostna talna vlaga!
Plateen WG 41,5	2-2,5	metribuzin + flufenacet	delovanje tudi na smolenec, travne plevela in plazečo pimico
Metric	1-1,5	klomazon + metribuzin	
Angelus	0,25	klomazon	- takoj po setvi in pred vznikom posevka
Clomate			
			najpozneje 7 dni po sajenju
Proman	3	metobromuron	- za zatiranje nekaterih enoletnih širokolistnih in ozkolistnih plevelov - za srednje pozne in pozne sorte krompirja
Sinopia	3	klomazon + metobromuron	- škropiti takoj po sajenju (do 5 dni po sajenju) - v neugodnih razmerah (pomanjkanje vlage v tleh, zmrzal, obilne padavine na lahkih tleh) možnost fitotoksičnega delovanja
Challenge, Challenge 600, Chanon	3-4	aklonifen	potrebna vlaga
Raba pred vznikom ali kmalu po vzniku krompirja			
Sencor SC 600, Buzzin	0,15-0,75	metribuzin	nekateri sorte so občutljive

Datum objave obvestila: 24.04.2023 12:49

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Meta

Pripravila: **Meta Zemljč**

Seznam registriranih FFS

