

38. VARSTVO OZIMNIH ŽIT - 04.05.2023 16:02 - Zaključeno



Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske imajo **ozimni ječmeni** sedaj že razvite vse liste in so v fazi razvoja listne nožnice (BBCH 41-45). Ob toplem vremenu in dobri namočenosti tal lahko v naslednjih dneh pričakujemo hiter razvoj rastlin in prehod v fazo klasenja. Na starejših listih so v večini posevkov opazna znamenja **ječmenove mrežaste pegavosti**, najmlajši trije listi pa so še zdravi, z izjemo nekaterih posevkov, kjer so se pege razširile že tudi na tretji in drugi najmlajši list. Je pa obdobje od sredine razvoja listne nožnice in med klasenjem ječmena (BBCH 45-55) primerno za preventivno zavarovanje posevkov pred **ječmenovo ramularijsko pegavostjo**, ki je zadnja leta najpomembnejša bolezen ječmena pri nas. Bolezen se sicer začne pojavljati šele po zaključenem klasenju, najbolj v obdobju vremena z močnim sončnim obsevanjem, vendar je takrat za njeno zatiranje že prepozno. Pridelovalcem zato priporočamo, da opravite škropljenje s fungicidom čim prej, ko bodo razmere na njivah dopuščale prehod. Uporabite lahko katerega od fungicidov kot so **Ascra xpro**, **Delaro forte**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **RevyCare**, **Siltra Xpro** ali tudi **Retengo**, ki omejuje pojave neparazitskih listnih pegavosti, ki se pogosto pojavljajo skupaj z ramularijsko pegavostjo. Če ste prvo škropljenje s fungicidom že izvedli med kolenčenjem ječmena, škropljenje ponovite po preteku približno dveh do treh tednov.

Tudi posevki **ozimne pšenice** se sedaj pospešeno razvijajo. Večinoma zaključujejo kolenčenje in razvijajo vrhnji list (BBCH 37-39). Na starejših listih so večinoma opazna znamenja okužb s pšenično listno pegavostjo, razvoju bolezni ustreza hladno in deževno vreme. Na mlajših listih peg še ne opažamo. Zgornji trije listi so poleg klasov najbolj zaslužni za polnjenje zrn in pridelek, zato naj čim bolj dolgo ostanejo zdravi. Priporočamo, da jih zavarujete pred glivičnimi okužbami takoj, ko se formira zastavičar. Za varstvo uporabite katerega od fungicidov kot so **Ascra xpro**, **Delaro forte**, **Elatus era**, **Eminent**, **Mirador forte**, **Priaxor EC**, **Prosaro**, **RevyCare**, **Siltra xpro**, **Verben** in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj žitnih strgačev, saj lahko številčne populacije ličink v kratkem času povzročijo veliko zmanjšanje listne površine. Ob pregledu njiv smo za sedaj opažali le odrasle hroščke in odložena jajčeca, ličink pa še ne, vendar se bo z otoplitvijo vremena razvoj pospešil in se stanje lahko hitro spremeni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 04.05.2023 16:02

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

