



51. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 05.05.2023 16:50 - Zaključeno



Nasadi jablan in hrušk so zaključili s cvetenjem. Oblikujejo se plodiči (71 po BBCH).

Pridelovalcem svetujemo, da nadaljujete s preventivnim pristopom varstva pred **jablanovim škrlupom**. Zaščitno fungicidno oblogo je potrebno obnoviti, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m². Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte še intenzivnost prirasta nove listne površine, s čimer naj razmiki v tem obdobju ne bodo daljši od 7 dni.

Izbirajte med zaščitnimi sredstvi kot sta preventivno in dotikalno delujoča **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha) ter **DELAN 70 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha; do velikosti plodičev 10 mm), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **FABAN** (1,2 l/ha), **AVALON** (1,125 l/ha), **LAITANE** (1,125 l/ha), **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l / 10.000 m² tretirane listne površine), **REYONA** (1,3 l / 10.000 m² tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na jablanovo pepelovko), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha; ni ga priporočljivo mešati z močljivim žveplom, a.s. kaptan, listnimi gnojili in rastnimi regulatorji). V kolikor vam razmere onemogočajo takojšnje varstvo, uporabite enega od pripravkov z daljšim kurativnim delovanjem: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha),... Slednje je potrebno uporabiti v kombinaciji z dotikalnim preventivnim sredstvom. V ekološki pridelavi pride v poštev **CURATIO – ŽVEPLENO APNENABROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred *jablanovim škrlupom*, *listnimi pegavostmi*, *jablanovo pepelovko* in *sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov*), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5x v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Pri varstvu pred *jablanovo pepelovko* uporabite **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha, oz. 0,4 l / 10.000 m² listne površine), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (2 l/ha). Vsi navedeni delujejo tudi na *jablanov škrlup*.

Po zaključenem cvetenju je pomembno tudi spremljanje populacij **rdeče sadne** in **navadne pršice**. V trenutnem obdobju so na stopnjah nimf in odraslih osebkov. V primeru preražmnosti priporočamo uporabo: **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje) ali **SHIRUDO** (0,5 kg/ha).

V primeru preseženega praga škodljivosti **jabolčne grizlice** (30 osic na ploščo) vam po popolnoma odcvetelih nasadih svetujemo **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode).

Kjer ste pred cvetenjem za zatiranje **listnih uši** in **sadnega listnega duplinarja** uporabili **NEEMAZAL – T/S** (do 4,5 l/ha), je sedaj primeren čas za drugi nanos. Stransko bo učinkoval tudi proti *jabolčni grizlici*. V poštev pride tudi pri ekološki pridelavi.

V zadnjih toplih dneh se je na zgodnjih legah opazno povečal nalet metuljev **jabolčnega zavijača**. Trenutno ugodne večerne temperature za uspešen razvoj odloženih jajčec še niso ustaljene, a se dejavniki sestavljajo.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrastí. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.05.2023 16:50

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

