42. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNIH BUČAH - 09.05.2023 07:07 - Zaključeno

Setev oljnih buč se je že pričela v preteklem tednu, padavine omogočajo dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov. Plevele v oljnih bučah lahko zatiramo pred setvijo s plitko zadelavo v tla ali takoj po setvi pred vznikom oljnih buč oz. po vzniku plevelov in buč.

V oljnih bučah so registrirani naslednji herbicidi: **Pripravek**	**Odmerek, čas uporabe**	**Za zatiranje:**
Centium 36 CS (klomazon 36%)	0,25 L/ha, po setvi pred vznikom posevka	Dobro zatira plevele, kot so npr.: navadna zvezdica (*Stellaria media*), perzijski jetičnik (*Veronica persica*), enoletna latovka (*Poa annua*) in plezajoča lakota (*Galium aparine*). Zadovoljivo zatira: belo metliko (*Chenopodium album*), poljski jetičnik (*Veronica arvensis*), navadno kostrebo (*Echinochloa crus – galli*) in škrlatno rdečo mrtvo koprivo (*Lamium purpureum*). Sredstvo ne zatre: navadne rosnice (*Fumaria officinalis*) in njivske vijolice (*Viola arvensis*).
Clomate (klomazon)	0,25 L/ha (2,5 mL na 100 m2), pred vznikom pred vznikom, od razvojne faze suhega semena do faze, ko je drugi pravi list na glavnem steblu v celoti razgrnjen (BBCH 00-12)	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevela
Successor 600 (petoksamid 60%) **Prepovedan na VVOI**	2,0 L/ha, takoj po setvi: najkasneje 3-5 dni po setvi	Sredstvo zatira ozkolistne plevele, kot so npr.: navadna kostreba (*Echinochloa crus-galli*), muhviči (*Setaria spp.*) in enoletna latovka (*Poa annua*) ter širokolistne plevele kot so npr.: srhodlakavi ščir (*Amaranthus retroflexus*), bela metlika (*Chenopodium album*), drobnocvetni rogovilček (*Galinsoga parviflora*), kamilice (*Matricaria spp.*), breskova dresen (*Polygonum persicaria*) in pasje zelišče (*Solanum nigrum*).
Flexidor (izoksaben 50%)	oljnih bučah v odmerku od 0,15 – 0,25 L/ha največ 0,75 L/ha.	Priporoča se uporabo takoj po setvi in pred vznikom buč in plevela (BBCH 00) oziroma najpozneje 3 dni po setvi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
Fusilade forte (fluazifop-p-butil 15%) (manjše uporabe)	0,8-1,3 L/ha po vzniku plevelov in buč	za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke (*Poa annua*)

Fusilade MAX (fluazifop-p-butil 2,5%) (manjše uporabe)	1 – 1,5 L/ha po vzniku plevelov in buč	za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke (*Poa annua*)
Devrinol 45 FL (napropamid 45%) (manjše uporabe)	v odmerku 2 - 2,5 L/ha (20-25 mL na 100 m2), tretira se pred setvijo s plitvo vdelavo (inkorporacijo) sredstva na globino 2-5 cm.	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela
Colzamid (napropamid 45%) (manjše uporabe)	v odmerku 2 - 2,5 L/ha (20-25 mL na 100 m2), tretira se pred setvijo s plitvo vdelavo (inkorporacijo) sredstva na globino 2-5 cm.	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 09.05.2023 07:07
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: **Jože Miklavc**
Seznam registriranih FFS