



40. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 10.05.2023 07:32 - Zaključeno



Po zaključenem cvetenju je v nasadih koščičarjev potrebno spremljati pojav različnih vrst škodljivcev in ob preseganju pragov škodljivosti ustrezno ukrepati.

Na češnjah se po cvetenju pojavlja črna češnjeva uš, ki jo zatiramo ob v primeru, da so kolonije prisotne na več kot 3% poganjkov. Za zatiranje uporabimo enega izmed registriranih insekticidov kot so **Afinto**, **Movento SC 100**, **Neemazal T/S** ali **Teppeki**. Na breskvah in nektarinah lahko za zatiranje listnih uši uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: **Afinto**, **Mospilan 20 SG**, **Neemazal T/S**, **Pirimor 50 WG** ali **Teppeki**. V nasadih sliv in češpelj, v katerih ste s spremljanjem naleta češpljeve grizlice ugotovili presežen prag škodljivost (30 osic na belo lepljivo ploščo) je po končanem cvetenju potrebno opraviti zatiranje škodljivca. Uporabite lahko insekticid **Mospilan 20 SG**, ki učinkuje tudi proti listnim ušem. Za zatiranje listnih uši lahko uporabite tudi pripravke **Movento SC 100**, **Neemazal T/S** ali **Teppeki**.

V nasadih koščičarjev po cvetenju občasno škodo povzročajo tudi gosenice malega zimskega pedica, ki se prehranjujejo na listih rastlin. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite pripravke: **Exirel** (češnje, višnje, slive), **Agree WG** in **Neemazal T/S**. Slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. **Tretiranje se opravi po cvetenju v času izleganja gosenic škodljivih metuljev.**

Nestanovitno vreme s pogostimi padavinami ustvarja ugodne pogoje za razvoj in širjenje glivičnih bolezni listja kot so listna luknjičavost koščičarjev, češnjeva listna pegavost, breskova kodravost, češpljeva rdeča listna pegavost in češpljeva rja. V nasadih, ki so že popolnoma odcveteli je potrebno izvajati preventivno varstvo pred naštetimi boleznimi. Škropljenje s fungicidi opravite pred padavinami.

Za varstvo višenj in češenj lahko uporabite katerega od pripravkov kot je **Delan 700 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Luna Experience**, **Signum**, **Syllit 544 SC** oz. **Syllit 400 SC** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Za varstvo sliv in češpelj so registrirani pripravki: **Delan 700 WG**, **Luna Experience**, **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC** in **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Za varstvo breskev in nektarin so na voljo pripravki: **Delan 700 WG**, **Luna Experience** in **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Insekticide uporabite le v nasadih, kjer je cvetenje dreves povsem zaključeno. Zaradi varstva čebel in drugih opraševalcev, je potrebno pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev preberite navodila za uporabo in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 10.05.2023 07:32

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

[Seznam registriranih FFS](#)

