



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Žita

/ 43. OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH BOLEZNI NA JEČMENU

43. OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH BOLEZNI NA JEČMENU - 10.05.2023 10:38 - Zaključeno



V SV Sloveniji so posevki **ozimnega ječmena** v fazi razvoja klasenja (BBCH 51 do 55), odvisno od sorte, nekatere zgodnje sorte pa že cvetijo (BBCH 60). Zaradi napovedanih padavin se je povečala nevarnost okužb s **ječmenovo ramularijsko pegavostjo**. Bolezen zatiramo preventivno zato priporočamo uporabo fungicidov.

Preglednica : Seznam fungicidov registriranih za zatiranje ramularijske begavosti ječmena

SREDSTVO	ODMEREK	Karenca
Ascra pro (fluopiram 6,5% ⁺ , propiokonazol 13% ⁺ biksafen 6,5%)	1,2-1 /ha	Čas uporabe
Zantara (biksafen 5% ⁺ tebukonazol 16,6%)	1,5 L/ha	35 dni
Cayunis (biksafen + spiroksamin + trifloksistrobin)	1 l/ha	Čas uporabe
Siltra xpro (biksafen 6% ⁺ protiokonazol 20%)	1 L/ha	Čas uporabe
Elatus era (Benzovindiflupir 7,5% ⁺ protiokonazol 15%)	1 L/ha	42 dni
Priaxor EC (Piraklostrobin 15%, fluksapiroksad 7,5 %)	1,5 L/ha	35 dni
Librax (Fluksapiroksad 6,25 % +metkonazol 4,5%)	1,33-2,0 L/ha	35 dni
Imtrex XE Fluksapiroksad 6,25 %)	2,0 l/ha	Čas uporabe
Delaro forte (protikonazol 9,33 % spiroksamin 10,7 % trifloksistrobin 8%)	1,2 - 1,5 L/ha;	42 dni
RevyCare (mefentriflukonazol 10%, piraklostrobin 10%)	1,5 L/ha	35 dni
Revystar XL (Mefentriflukonazol 10%, fluksapiroksad 5%)	1,0 – 1,5 L/HA	35 DNI
Revytrex (Mefentriflukonazol 6,67%, fluksapiroksad 6,67)	1,125 l/ha	35 dni
Revystar (mefentriflukonazol 10%)	1,5 l/ha	35 dni

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda.

Datum objave obvestila: 10.05.2023 10:38

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS



