



44. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 15.05.2023 12:45 - Zaključeno



Na območju Celjske regije je **jablana** v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključila cvetenje in **prehaja oz. dosega fenološko fazo BBCH 71** (plodiči večji od 10 mm). Pri sortah gala, zlati delišes, elstar, fuji je premer plodičev od 7 do 10 mm, medtem ko pri sortah idared, carjevič, breaburn, nad 10 do 15 mm. **Hruška** je povprečno na opazovano lokacijo in sorto v fenološki fazi **BBCH 71 -72**.

Škr lup in pepelasta plesen jablan

V zadnjih osmih dneh so bili na opazovanih sadjarskih lokacijah trikrat izpolnjeni pogoji za okužb s škrlupom: med 6. in 8. majem za eno močno in eno zmerno ali lahko ter med 10. in 15. majem za močno okužbo. V zadnjih petih je na območju Celjske in Koroške regije padla zelo velika količina dežja, na sadjarskih lokacijah smo zabeležili med 50 in 80 mm padavin, čas trajane pogojev za zadnjo okužbo je več kot štiri dni. V naravi smo v tem obdobju beležili kontinuirane izbruhe askospor.

Vremenska napoved v naslednjih dveh dneh napoveduje ponovno veliko količino dežja.

V primeru, da je od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in več ter glede na veliko količino dežja in dolgotrajno omočenost liste mase svetujemo uporabo sistemskih IBE pripravkov na osnovi a.s. difenkonazol: **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Difenzone** (0,2 L/ha) ali tetrakonazol: **Domark 100 EC** (0,4 l/ha) ali **mefentriflukonazol: Revyona** (1,3 L/10.000 m² tretirane površine listne stene, pri čemer je največji dovoljeni odmerek 2 L/ha) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi na osnovi a.s. ditianon: **Delan Pro** (2,5 L/ha), **Alcoban** (0,75kg/ha) ali **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha) ali a.s. metiram **Polyram DF** (2 kg/ha).

V obdobju nestanovitnega vremena lahko uporabite tudi pripravek **Difol** (3,5 L/ha). Sredstvo se uporablja preventivno, ima pa izraženo tudi kratko kurativno delovanje (KARENCA 110 dni!).

V drugi polovici tedna so napovedane stabilnejše vremenske razmere in s tem tudi možnost nadaljevanja preventivnega pristopa varstva proti škrlupu ter uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi a.s. ditianon: **Delan Pro** (2,5 L/ha), **Alcoban** (0,75kg/ha) ali **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha) ali na osnovi a.s. kaptan: **Captan 80 WG** (2kg/ha) **Merpan 80 WDG** (1,88 kg/ha), **Orthocide 80 WG** (2 kg/ha), **Scab 80 WG** (1,9 kg/ha), **Scab 480 SC** (3,13 L/ha) ali **Merplus** (2 L/ha – letos se ne trži).

V nasadih, kjer opazate močnejši pojav **jablanove pepelovke** svetujem **po ustalitvi vremena** dodajanje pripravkov kot sta: **Luna experience** (0,75 L/ha) ali **Sercadis** (0,25 L/ha). Sercadis se uporablja tudi za zmanjšanje okužb jablanovega in hruševega škr lupa (0,25 – 0,3 L/ha). V **kombinaciji s kontaktnim fungicidom** lahko uporabite tudi pripravek **Sercadis plus**, ki deluje hkrati na škrlup in pepelasto plesen. Prav tako bi bila smiselna uporaba kombinacije kontaktnih fungicidov in registriranih pripravkov na osnovi strobilurinov kot so: **Stroby WG** (0,2 kg/ha), **Zato 50 WG** (0,15 kg/ha) ali **Ter cel** (2,5 kg/ha), ki pa se v letošnjem letu ne trži.

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Sulfar** ali **Azumo WG** (od BBCH 69), v odmerku 3 kg/ha oz. 3L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Krvava uš

Migracija krvave uši po deblu navzgor se stopnjuje. Po ustalitvi in otoplitvi vremena pričakujemo tudi hitrejši razvoj in pospešeno migracijo krvave uši z večletnega lesa na enoletne poganjke. **Preglejte nasade jablan. Prag škodljivosti oz. kritično število je 12 kolonij krvave uši na sto poganjkov oz. 5 - 8 % napadenih vej.**

V primeru preseganja praga škodljivosti **po ustalitvi vremena opravite škropljenje**. Uporabite lahko pripravek **Pirimor 50 WG (0,75 kg/ha) z dodatkom močila ali olja**. Uporabite veliko količino vode (vsaj 800 L/ha) in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke. Pri zatiranju upoštevajte, da so za bolj učinkovito delovanje pripravka potrebne temperature zraka nad 15 °C. Prav tako je za zatiranja krvave uši mogoče uporabiti tudi pripravek **Movento SC 100** (1,9 L/ha). Z njim bo smiselno škropiti v vseh tisti nasadih, kjer imate poleg krvave uši težave tudi z obvladovanjem **vejičastega in ameriškega kaparja**. **Njegovo uporabo načrtujte predvsem v času, ko se množično izlegajo gibljive ličinke prvega rodu ameriškega kaparja (konec maja – začetek junija).** Uporaba pripravka priporočamo tudi v mladih nasadih jablan, kjer imate težave z **jablanovo listno hrčico**.

OPOZORILO: Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele je pred uporabo le teh potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev nevarnih za čebele, je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda in predpisane razdalje od voda I. in II. reda.

Jabolčni zavijač

V zadnjih petih dneh so ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vaba zaradi deževnega in hladnejšega vremena manj številčni kot v prvi dekadi maja. Do sedaj tudi niso bili izpolnjeni pogoji za parjenje in odlaganje jajčec. O dinamiki leta in optimalnih rokih zatiranja vas bomo pravočasno obveščali.

Datum objave obvestila: 15.05.2023 12:45

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Priprava: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024