

47. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 16.05.2023 12:09 - Zaključeno



Vremenske razmere s pogostimi in obilnimi padavinami v mesecu maju so povečale tveganje za okužbo s krompirjevo plesnijo (*Phytophthora infestans*). Tako je na večini spremljanih lokacij indeks kumulativne vrednosti za krompirjevo plesen že presegel vrednost 150, na posameznih pa vrednost že presegla 200. Zato priporočamo, da pregledate posevke krompirja in jih poškropite. Na površinah, kjer vrste še niso sklenjene, je še vedno mogoče uporabiti kontaktne pripravke, medtem ko na površinah, kjer so vrste tik pred sklenitvijo ali so sklenjene, priporočamo uporabo polsistemičnih ali sistemskih pripravkov.

Za zatiranje krompirjeve plesni je mogoče uporabiti sledeče fungicide s **kontaktnim delovanjem**:

Fungicid	Aktivna snov	Odmerek (kg, L/ha)	Karenca (dni)	Registriran za
POLYRAM DF	metiram 70	2,0	21	za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
RANMAN TOP	ciazofamid 16	0,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
SHIRLAN 500 SC	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
WINBY	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
ENERVIN	ametoktradin 12 + metiram 44	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
FROWNCIDE	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
BANJO	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
BADGE WG	Cu – bakrov hidroksid 24,4 + Cu – bakrov oksiklorid 24,5	3,0	7	za zmanjševanje okužb krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
CUPRABLAU Z 35 WG	Cu – bakrov oksiklorid 35	2,1	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
CUPRABLAU Z 35 WP	Cu – bakrov oksiklorid 35	3,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>) in za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (<i>Alternaria solani</i>)
NORDOX 75 WG	Cu – bakrov oksid 75	1,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
ZIGNAL SUPER	Azoksistrobin 15 + fluazinam 37,5	0,5	7 dni	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>) in za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (<i>Alternaria solani</i>)

Seznam fungicidov registriranih za krompirjevo plesen – **sistemski, polsistemski pripravki**:

Fungicid	Aktivna snov (%)	Odmerek (kg, L/ha)	Karenca (dni)	Registriran za
BANJO FORTE	dimetomorf 20 + fluazinam 20	1,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)

CARIAL FLEX	cimoksanil 18 + mandipropamid 25	0,6	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
COPFORCE EXTRA	Cu - bakrov hidroksid 30 + cimoksanil 6	2,0	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
CURZATE PARTNER (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 60	0,15	1 oz. K kontakt. funicida	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
CYMBAL (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 45	0,2 – 0,25	7	za zmanjševanje okužb v razmerah srednje visokega pritiska bolezni krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
INFINITO	fluopikolid 6,25 + propamokarb 62,5	1,2 – 1,6	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
ORVEGO	ametoktradin 30 + dimetomorf 22,5	0,8	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
PROXANIL 450 SC	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2,0 - 2,5	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
REBOOT	cimoksanil 33 + zoksamid 33	0,45	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
REVUS (dodati kontaktni fung.)	mandipropamid 25	0,6	3	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
REVUS TOP	difenokonazol 25 + mandipropamid 25	0,6	3	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>) in črnih listnih pegavosti krompirja (<i>Alternaria</i> spp.)
RIVAL DUO	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2,5	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
PROXANIL 450 SC	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2 - 2,5	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
SACRON 45 DG (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 45	0,22	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
ZORVEC ENDAVIA	bentiavalikarb-izopropil 7 + oksatiapiiprolin 3	0,4	7	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 16.05.2023 12:09

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravljen: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

