



64. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 19.05.2023 14:32 - Zaključeno



V nasadih koščičastih sadnih vrst so se z nestanovitnim vremenom in obilico padavin vzpostavili ugodni pogoji za širjenje *listne luknjičavosti koščičarjev* in *listnih pegavosti* in *češpljeve rje*. Priporočamo varstvo s pripravki kot so:

DELAN 700 WG (0,75 kg/ha; breskev, češnja, marelica, nektarina, sliva, višnja),

MERPAN 80 WDG (2,25 kg/ha; češnja in višnja), **LUNA EXPERIENCE** (največ 0,6 l/ha; breskev in nektarina, češnja in višnja, slive), **SIGNUM** (0,75 kg/ha; češnja in višnja, sliva), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha; češnja in višnja) ali **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha; češnja in višnja), **MAVITA 250 EC** (0,22 l/ha; slive), **SCORE 250 EC** (0,22 l/ha; slive) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin.

Nasade breskev, nektarin in marelic je potrebno zaščititi tudi pred okužbami z **breskovo**, oz. **marelično pepelovko**. V poštev pridejo **PRIPRAVKI NA OSNOVI ŽVEPLA** (5-7,5 kg/ha, oz. 5-6 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha), **MAVITA** (0,45 l/ha), **FYTOSAVE** (2 l/ha) ali **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin.

Svetujemo tudi spremjanje razvoja kolonij *listnih uši*. V nasadih češenj je najnevarnejša je **črna češnjeva uš** (prag škodljivosti 3 % napadenih poganjkov po cvetenju), v breskvah **siva breskova uš** (prag škodljivosti 7 % napadenih poganjkov po cvetenju na breskvah in 3 % na nektarinah) ter na slivah **mokasta** in **zelena češpljeva uš** (prag škodljivosti 5 % napadenih poganjkov). V primeru prerazmnožitev svetujemo **AFINTO** (0,14 kg/ha; breskev, češnja, marelica, nektarina, sliva, višnja), **TEPPEKI** (0,14 kg/ha; breskev, češnja, marelica, nektarina, sliva, višnja), **MOVENTO SC 100** (1,5 l/ha; češnja, sliva, višnja), **MOSPILAN 20 SG** (0,025-0,04 % konc.; breskev, marelica, nektarina, sliva), **PRIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha; breskev in nektarine) ali **NEEMAZAL T/S** (4,5 l/ha; breskev, češnja, marelica, nektarina, sliva, višnja).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 19.05.2023 14:32

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

