



51. VARSTVO PEČKARJEV - 23.05.2023 09:52 - Zaključeno



Nestanovitno vreme predstavlja nevarnost za okužbe listja pečkatih vrst sadja s škrlupom. Priporočamo nadaljevanje preventivnega pristopa varstva s sredstvi z dotikalnim delovanjem kot so **Alcoban**, **Delan pro**, **Delan 700 WG**, **Polyram** ali **Captan 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Merplus**, **Orthocide 80 WG** ali **Scab 80 WG** oz. **Scab 480 SC**. V obdobju intenzivnega priraščanja listne mase in plodičev, je fungicidno oblogo potrebno obnavljati na 5-7 dni oz., če je od zadnjega škropljenja skupno padlo več kot 25 mm dežja. Ob dolgotrajnih padavinah je možna uporaba sistemskih, IBE pripravkov z daljšim kurativnim delovanjem: **Difcor 250 EC**, **Difenzone**, **Difol**, **Domark 100 EC**, **Mavita 250 EC**, **Revyona**, **Score 250 EC**. Vsem sistemskimi sredstvom je potrebno dodati dotikalni fungicid razen pripravkoma **Difol** in

Faban.

V nasadi opazamo vse več okužb z jablanovo pepelovko, saj so z rastjo dnevnih temperatur pogoji za njen razvoj vedno bolj ugodni. Za uspešno zaščito je poleg kemičnega varstva, nujno potrebno izvajati tudi tehnološke ukrepe kot je izrezovanje plesnivih poganjkov. Izrezane poganjke je priporočljivo dati v vreče in jih odnesti iz nasada ter zažgati. V nasadih, kjer imate manjše težave z boleznijo je priporočljivo škropilni brozgi dodati enega od registriranih **žveplovih pripravkov**. V močnejše okuženih nasadih svetujemo, da namesto žvepla uporabite enega izmed sistemskih fungicidov kot so **Luna experience**, **Luna Care**, **Stroby WG**, **Zato 50 WG**, **Tercel** ali **Sercadis**.

V ekološki pridelavi za varstvo pred jablanovim škrlupom in pepelovko uporabite pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, **Vitisan** in **Karbicure**.

Bodite pozorni na zgodnje simptome prerasnjožitve predvsem rdeče sadne pršice ter tudi drugih škodljivih vrst pršic. Ob preseženem pragu škodljivosti ukrepajte z enim izmed akaricidov, ki delujejo tudi na odrasle pršice (**Kanemite**, **Shirudo** in **Milbeknock**).

Za zatiranje krvave uši lahko ob preseženem pragu škodljivosti ukrepate z insekticidom **Movento SC 100**, katerega uporaba je primernejša v nasadih, kjer imate težave tudi z ameriškim kaparjem in pršicami, lahko pa uporabite tudi pripravek **Pirimor 50 WG**.

Zaradi spremenljivega vremena, ulovi jabolčnega zavijača niso konstantni. Glede na vremensko napoved in razvoj škodljivca pričakujemo, da bo v prihodnjem tednu ustrezen čas za ukrepanje, o čemer vas bomo še obvestili.

Pred škropljenjem preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Pripravili: David Snoj

Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 23.05.2023 09:52

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

[Seznam registriranih FFS](#)

