



50. Varstvo vinske trte - 29.05.2023 09:42 - Zaključeno



Vinska trta hitro napreduje v razvoju in naglo prirašča. V večini vinogradov je glavnina sort v fazi aktivne rasti listov in razvoja socvetij. Na toplejših lokacijah bodo sorte, ki so hitrejše v razvoju, kmalu pričele cveteti. Razmere za okužbe s peronosporo vinske trte so še naprej ugodne, zato je za naslednje škropljenje priporočljivo uporabiti fungicide s kombiniranim kontaktnim in sistemskim oz. polysistemskim načinom delovanja, ki nudijo dolgotrajnejše varstvo pred okužbami. Na voljo so naslednji pripravki: **Allum, Ampexio, Cymbal, Enervin, Folpan Gold, Forum star, Magma triple, Mikal flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Orondis, Orvego, Pergado D, Pergado F, Pergado SC, Profiler, Reboot, Revus, Sanvino, Sfinga Extra WDG, Twingo in Zorvec Vinabel**. Časovni razmiki med posameznim škropljenji naj v tem obdobju ne bodo daljši od 8-10 dni oz. jih je potrebno prilagoditi intenzivnosti prirasta in količini padavin. Posebno pozornost je potrebno nameniti varstvu vinogradov, kjer so bolezenska znamenja na listih že prisotna. Tam je smiselno časovne razmike med škropljenji skrajšati in pri izbiri pripravkov dati prednost fungicidom z eradikativnim delovanjem (pripravki na osnovi aktivnih snovi dimetomorf, ciazofamid, iprovalikarb ipd.).

Z višanjem temperatur zraka se postopoma povečuje tudi nevarnost za okužbe z oidijem. Za varstvo pred omenjeno boleznijo uporabite enega izmed naslednjih sistemskih pripravkov: **Collis, Difcor 250 EC, Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Revyona, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Unicorn DF** ali **Vivando**. Škropilni brozgi je priporočljivo dodati tudi **žveplo** v zmanjšanem odmerku.

V ekološki pridelavi grozdja proti peronospori uporabite pripravke na osnovi bakra kot so **Badge WG, Cuprablau Z 35 WG** oz. **Z 35 WP, Cuproxat, Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**. Za varstvo pred oidijem škropilni brozgi dodajte žveplov pripravek kot je **Azumo, Biotip Sulfo 800 SC, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol Disperss, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin, Pol-Sulphur 80 WG/WP** oz. **800 SC, Sulfar, Thiovit jet, Vindex 80 WG** ali **Vertipin**. Proti oidiju lahko uporabite tudi sredstva na podlagi mikroorganizmov kot so **AQ 10, Sonata, Taegro** ali pripravek **Karbicare** (kalijev hidrogen karbonat).

Pred škropljenjem preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 29.05.2023 09:42

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

Seznam registriranih FFS

