



Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Pečkarji / 51. VARSTVO PEČKARJEV

51. VARSTVO PEČKARJEV - 31.05.2023 07:14 - Zaključeno



Pridelovalce obveščamo, da je nevarnost primarnih okužb z **jablanovim škrlupom** končana. Trosišča so izčrpana, prav tako se je lansko listje popolnoma razgradilo. Kljub temu je potrebno še naprej skrbeti za ustrezno preventivno varstvo. Posebno pozornost velja nameniti zaščiti plodičev v sadovnjakom kjer so na listih prisotne pege škrlupa. Za zaščito lahko še vedno uporabite sredstva na osnovi ditianona (**Delan Pro, Delan 700, Alcoban**). V nasadih kjer ni prisotnih peg lahko povečate razmike med škropljenji 10-14 dni. Spremljajte vremensko napoved in škropljenja prilagodite vremenskim razmeram in količini padavin. Uporabite lahko kontaktne pripravke na osnovi kaptana (**Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Merplus, Scab 80 WG oz. 480 SC**).

Tudi v primeru toče, v najkrajšem možnem času opravite škropljenje z enimi izmed zgoraj naštetih sredstev na osnovi **kaptana**.

Ekološki sadjarji lahko za varstvo pred **jablanovim škrlupom in pepelovko** uporabite pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga, Vitisan in Karbicare**.

V močnejše okuženih nasadih z **jablanovo pepelovko** lahko namesto žvepla uporabite enega izmed sistemskih fungicidov kot so **Luna experience, Luna Care, Stroby WG, Topas 100 EC Zato 50 WG, Tercel** ali **Sercadis**. V nasadih z manjšim potencialom za okužbe pa je priporočljiva uporaba sredstev na osnovi **žvepla**. Poleg kemičnega varstva, je nujno potrebno izrezovati plesnive poganjke. Izrezane poganjke damo v vreče in jih odnesemo iz nasada ter zažgemo.

V ekološki pridelavi za varstvo pred **jablanovim škrlupom in pepelovko** uporabite pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga, Vitisan in Karbicare**.

Še naprej bodite pozorni na zgodnje simptome prerazmnožitve **škodljivih vrst pršic**. Ob preseženem pragu škodljivosti ukrepajte z enim izmed akaricidov (**Kanemite, Shirudo in Milbeknock**).

Za zatiranje **krvave uši in listnih uši**, ob preseženem pragu škodljivosti, ukrepajte z insekticidom **Movento SC 100, Pirimor 50 WG**. Pri aplikaciji je priporočljiva uporaba močila.

Ulovi jabolčnega zavijača so konstantni vendar relativno nizki. Ob segrevanju ozračja bo tudi razvoj škodljivca pospešen. V sredini tega tedna bo za zmanjševanje populacije škodljivca še ustrezna uporaba pripravka **Harpun**, ki ima ovoidno delovanje. Sredstvo deluje tudi na ličinke **ameriškega kaparja**. Konec tedna bo primeren čas za uporabo pripravkov **Coragen** ali **Voliam**, ki delujeta predvsem na izglele gosenice. Uporabite lahko tudi insekticid **Exirel**. Za fiziološko oslabeitev gosenic priporočamo dodajanje biotičnih sredstev na osnovi virusa granuloze kot sta **Madex max in Carpovirusine**. Sredstvi sta dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in korenčne dobe ter jih upoštevajte. Ob uporabi insekticidov odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj jutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih!

Datum objave obvestila: 31.05.2023 07:14

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

