

51. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 31.05.2023 20:51 - Zaključeno



Češnjeva muha

Na območju Celjske in Koroške regije najbolj zgodnje sorte češenj vstopajo v fenološko fazo zorenja (BBCH 81). Zato v nasade srednjih in poznih sort češenj obesite rumene lepljive plošče za spremljanje pojava češnjeve muhe (dve lepljivi plošči na hektar). Plošče obesite na južno stran krošnje. Prag škodljivosti je presežen, če ulovimo eno muho na dve postavljeni plošči od faze, ko češnje spreminjajo barvo iz zelene v rumeno.

Ob preseganju praga škodljivosti opravite škropljenje z enim od insekticidov kot sta:

Exirel (75 mL/hL oz. največ 1 L/ha) – karenca 7 dni ali **Mospilan 20 SG** (0,375 kg/ha) - karenca 14 dni. Prav tako lahko uporabite biotični insekticid na osnovi glive *Beauveria bassiana* **Naturalis** (2 L/ha), ki nima karence. Z njim opravite vsaj tri tretiranja v časovnem razmiku 5 do 7 dni.

Za povečanje učinkovitosti lahko insekticidom dodate beljakovinsko prehransko vabo **Nutrel** (1,5 % konc.).

Za zmanjšanje deleža poškodovanih plodov, ki jih povzroča češnjeva muha lahko uporabite tudi insekticidno vabo (past) **DECIS TRAP ČEŠNJEVA MUHA**. Vaba je že pripravljena za neposredno uporabo. V nasad češenj se enakomerno porazdeli 100 vab na ha. Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

Pri zgodnjih sortah češenj muhe ni potrebno zatirati. Tudi na vrtovih NE priporočamo zatiranja češnjeve muhe z insekticidi. Svetujemo, da v vrtovih obesite rumene lepljive plošče na katere se lovi češnjeva muha. Obesite 10 plošč na drevo (na zahodno in južno stran krošnje).

Po končanem obiranju plošče odstranite.

Plodova vinska mušica

V nasade češenj in višenj za spremljanje pojava plodove vinske mušice izobesite **prehranske pasti**. Te lahko naredite sami. V 0,5 L plastenko na zgornjem delu zavrtate 4 do 5 luknjic, katerih premer naj ne bo večji od 5 mm in zgornji del plastenke pobarvate z rdečo barvo, ki privablja škodljivko. V plastenko nalijete 1 dl raztopino jabolčnega kisa in rdečega vina (razmerje 3:1) in dodate čajno žličko sladkorja (1 žličko na liter raztopine). Platenko zaprite in jo obesite v nasad na višino 1,5 m od tal. V času dozorevanja plodov redno pregledujte vabe.

Za zatiranje plodove vinske mušice na češnjah in višnjah so registrirani naslednji pripravki:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
Exirel	75 mL/hL oz. največ 1 L/ha	7
Laser Plus (manjše uporabe)	0,15 L/ha	7
Asset Five		
Pripravku izdano dovoljenje za nujne primere..	0,96 L v 1500 L vode na ha oziroma v 0,064 %	7

Navadna sadna gnoloba

V nasadih poznih sort češenj v primeru pogostih padavin opravite proti navadni sadni gnolobi preventivno škropljenje z enim od pripravkov, ki so navedeni v naslednji preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)	Karenca (dni)
Luna experience	0,2 L na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,6 L/ha	7
Libreto	1 L/ha	3
Prolectus	400 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1,2 kg/ha	1
Revyona	1,8 L/ha	3
Signum	0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha	7
Switch 62,6 WG	0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha	7
Teldor SC 500	0,5 L na 1 m višine krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 1,5L/ha	3

Preparat	Odmerek (koncentracija)	Karenca (dni)
Amylo-X	2 – 2,5 kg/ha	ni potrebna
Serenade ASO	8 L/ha	ni potrebna
Taegro	0,185-0,37 kg/ha	1

Pripravki na osnovi mikroorganizmov Amylo-X, Serenade ASO in Taegro imajo dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Datum objave obvestila: 31.05.2023 20:51
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**
[Seznam registriranih FFS](#)