



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Krompir
/ 59. OBVESTILO O VARSTVO KROMPIRJA PRED KOLORADSKIM HROŠČEM

59. OBVESTILO O VARSTVO KROMPIRJA PRED KOLORADSKIM HROŠČEM - 05.06.2023 09:16 - Zaključeno



V preteklem tednu smo že opazili prve izležene ličinke koloradskega hrošča. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo pospešeno izleganje ličink. Zatirati je potrebno nižje razvojne stadije ličink, prag škodljivosti je presežen, ko so na več kot 20% grmov odložena jajčeca in je izleženih 15 - 20 mladih ličink na rastlino. Letno uporabimo insekticide v krompirju dva do največ trikrat. Pomembno je, da vsakič uporabimo insekticid iz druge kemične skupine, ker hrošč hitro razvija rase odporne na insekticide.

Za zatiranje je mogoče uporabiti sledeče insekticide:

AKTIVNA SNOV	FITOFARM. SREDSTVO	ODMEREK	KARENCA
azadirahtin A	Neemazal T/S	2,5 l/ha	4 dni
	Azatin EC	1,5 l/ha	3 dni
acetamiprid	Mospilan 20 SG	0,1 kg/ha	14 dni
repično olje + piretrin	Raptol koncentrat	8 l/ha	3 dni
spinosad (spinosin A+spinosin D)	Laser 240 SC	0,2 l/ha	7 dni
	Laser plus	0,04 l/ha	14 dni
klorantraniliprol	Coragen	0,06 l/ha	14 dni
	Voliam	0,06 l/ha	14 dni
metaflumizon	Alverde	0,25l/ha	14 dni
ciantraniliprol	Benevia	0,125 l/ha	14 dni
piretrin	Asset five	0,38 L/ha	3 dni

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 05.06.2023 09:16

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

