



Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Pečkarji / 52. VARSTVO PEČKARJEV

52. VARSTVO PEČKARJEV - 05.06.2023 15:14 - Zaključeno



V nasadih pečkarjev kjer so na listih prisotne pege škrupa, je tekom poletja potrebno nadaljevati s preventivnim varstvom pred sekundarnimi okužbami z jablanovim škrlupom. Trenutne vremenske razmere zaradi pogostih padavin predstavljajo veliko nevarnost za sekundarne okužbe. Za varstvo uporabite enega izmed kontaktnih pripravkov na osnovi kaptana (**Captan 80 WG, Merpan 80 WDC, Orthocide 80 WG, Merplus, Scab 80 WG oz. 480 SC**). V nasadih kjer ni prisotnih peg lahko povečate razmike med škropljenji na 10-14 dni oz. škropljenja prilagodite vremenskim razmeram in količini padavin. V primeru daljšega deževnega obdobja svetujemo uporabo sistemskih pripravkov kot so **Difcor 250 EC, Difenzone, Difol, Domark 100 EC, Mavita 250 EC, Revyona, Score 250 EC** katerim je potrebno dodati dotikalni fungicid, izjema je pripravek **Difol**.

Ekološki sadjarji lahko za varstvo pred jablanovim škrlupom in pepelovko uporabite pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga, Vitisan in Karbicare**.

V sadovnjakih, ki jih je prizadela toča, v najkrajšem možnem času po neurju opravite škropljenje z enimi izmed sredstev na osnovi **kaptana**.

V nasadih kjer je vidnih več simptomov okužb z jablanovo pepelovko priporočamo, da za varstvo uporabite enega izmed sistemskih fungicidov kot so **Luna experience, Luna Care, Strobby WG, Topas 100 EC, Zato 50 WG, Tercel** ali **Sercadis**. V nasadih z manjšim potencialom za okužbe je priporočljiva uporaba sredstev na osnovi **žvepla**, ki ima stransko delovanje tudi na pršice. Poleg kemičnega varstva je nujno potrebno izrezovati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Ulovi metuljev jabolčnega zavijača so konstantni in se postopoma povečujejo. Razmere za let metuljev in parjenje ter odlaganje jajčec so ugodne. V nasadih kjer na feromonskih vabah opazate presežen prag škodljivosti (7-10 metuljev / teden), lahko uporabite insekticida **Coragen** ali **Voliam**. Na voljo je tudi sredstvo **Exirel**. Za fiziološko oslabitev gosenic priporočamo dodajanje biotičnih sredstev na osnovi virusa granuloze kot sta **Madex max** in **Carpovirusine**. Sredstva sta dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in karenčne dobe ter jih upoštevajte. Ob uporabi insekticidov odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih!

Datum objave obvestila: 05.06.2023 15:14

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

