



61. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.7 - 07.06.2023 06:37 - Zaključeno



Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejšje v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 57 - 61 (socvetja popolnoma razvita, cvetovi ločeni – začetek cvetenja, okoli 10% cvetnih kopic odpadlo).

Zaradi bujne rasti vinske trte in pogostih padavin za preprečitev novih okužb s **peronosporo vinske trte** priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov kot so: **Allum** (2,5 kg/ha) ali **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Cymbal** (0,25 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Fytosave** (2 L/ha, dovoljen v ekološki pridelavi) ali **Folpan Gold** (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2kg/ha) ali **Forum star** (1,6 kg/ha) ali **Magma triple WG** (3 kg/ha) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Mikal Premium F** (3 kg/ha) ali **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Momentum F** (4 kg/ha) ali **Orondis** (0,32 L/ha) ali **Orondis ultra** (0,67 L/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha) ali **Pergado D** (1,4 L/ha) ali **Pergado F** (3,0 kg/ha) ali **Pergado SC** (0,6 L/ha) ali **Reboot** (0,4 kg/ha) ali **Revus** (0,6 l/ha) ali **Sanvino** (0,75 kg/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha) ali **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha) ali **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (2 kg/ha) ali **Zorvec vinabel** (0,6 L/ha) ali **Zorvec Zelavin** (0,32 L/ha).

Priporočamo, da naj presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Uporabiti je mogoče tudi priprava **LBG-01F34** ali **Sorale LX** v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi *folpet*) ali **Foshield** (2 L/ha) ali **Delan pro** v odmerku 3 L/ha.

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (4 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Allum**, **Cymbal**, **Orondis**, **Pergado SC**, **Revus** in **Zorvec zelavin** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

V **ekološki pridelavi** lahko za zatiranje peronospore uporabite enega izmed naslednjih bakrovih pripravkov: **Badge WG** ali **Cuproxat** ali **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**.

Nevarnost za pojav **oidija vinske trte** se je z otoplitvijo vremena povečala. Trenutno se oidiag indeks na posameznih opazovanih lokacijah giblje med 49 in 66 (vrednost 66 in več predstavlja veliko nevarnost za pojav in razvoj bolezni). Za preprečitev okužb s to boleznijo lahko uporabite enega od naslednjih pripravkov: **Collis SC** (0,4 l/ha) ali **Custodia** (0,35 L/ha) ali **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha) ali **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) ali **Dynali** (0,65 l/ha) ali **Folicur EW 250** (0,4 L/ha) ali **Fytosave** (2 L/ha, dovoljen v ekološki pridelavi) ali **Karathane Gold 350 EC** (0,5 l/ha) ali **Karbicure** (5 kg/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,375 l/ha) ali **Luna max** (1 l/ha) ali **Mavita** (0,2 l/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,4 l/ha) ali **Prosper CS 300** (1 L/ha) ali **Revyona** (2 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Sercadis** (0,15 L/ha) ali **Spirox D** (0,5 l/ha) ali **Talendo** (0,25 L/ha) ali **Talendo extra** (0,13-0,3 l/ha) ali **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 l/ha) ali **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali **Vivando** (0,16 l/ha).

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG** (4-8 kg/ha) ali **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Microthiol Disperss** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Vertipin** (5-7,5 L/ha) ali **Cosinus** (8 kg/ha) oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (3,6 -8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

Trenutno v vinogradih najdemo ličinke prvega (L1) in drugega (L2) stadija **ameriškega škrtatka** – prenašalca zlate trsne rumenice. Zaradi nevarnosti insekticidov za čebele in cvetenja vinske trte vas bomo o času uporabe insekticidov za zatiranje ameriškega škrtatka pravočasno obvestili.

V PRIMERU POJAVA NEURIJ IN TOČE IMAJO PRI ZAŠČITI VINSKE TRTE PREDNOST PRIPRAVKI, KI VSEBUJEJO A.S. FOLPET: (**Forum star**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F**, **Folpan Gold**, **Mikal flash** in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin**, **Basfoliar aktiv** ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 07.06.2023 06:37

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: Miro Mešl

