



54. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 07.06.2023 10:40 - Zaključeno



Na območju Celjske in Koroške regije je jablana in hruška povprečno na opazovane lokacije in sorte v **fenološki fazi BBCH 73** (sekundarno odpadanje plodičev)

Jabolčni zavijač

Kljub nestanovitnemu vremenu so temperature zraka ves čas ugodne za razvoj ter parjenje in odlaganje jajčec jabolčnega zavijača. Ulovi metulčkov na feromonskih vabah so na večina opazovanih lokacijah Celjske regije kontinuirani, a manj številni kot v preteklem tednu.

Tisti, ki še niste in boste prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču opravili s pripravkom **Coragen** ali **Voliam** (odmerek: 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek pri enem škropljenju jablan ne sme presegati 270 mL pripravka/ha), to storite takoj, ko vam dopuščajo vremenske razmere.

V kolikor boste prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču opravili s pripravkom **Mimic** (0,9 - 1L/ha), **Delegate 250 WG** (0,3 kg/ha), **Laser plus** (0,3 L/ha) ali boste uporabili **Mospilan 20 SG** (0,4 kg/ha), to storite **od konca tega do sredine prihodnjega tedna, med 9. in 14. junijem**. V primeru pojava **mokaste** ali močnejšega pojava **zelene jablanove uši**, dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača prednost pripravku **Mospilan 20 SG**.

Vsi naštet pripravi za zatiranje jabolčnega zavijača delujejo tudi proti **breskovemu zavijaču**, ki se redno pojavlja v nasadih breskev in jablan.

Poleg kemičnih insekticidov priporočamo za slabljenje populacije jabolčnega zavijača dodajanje granuloznega virusa **Madex max** ali **Carpovirusine**.

Rdeča sadna pršica

Visoka relativna zračna vlaga in ugodne temperature zraka ustvarjajo pogoje za razvoj rdeče sadne pršice. Zato bodite pozorni in pregledujte nasade. V primeru, da najdete 4 do 5 ličink na list, opravite škropljenje z enim od pripravkov kot sta: **Shirudo** - staro ime Masai (0,5 kg/ha) ali **Milbeknock** (0,625 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravek **Knemite SC** (0,625 L/meter višine krošnje) ali **Nissorun 10 WP** (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha).

Krvava uš in listen uš

Krvava uš intenzivno migrira po deblu, kakor tudi poganjkih in tvori kolonije. Nadaljujte s spremljanjem razvoja škodljivke. V primeru preseganja praga škodljivosti (12 kolonij krvave uši na sto poganjkov oz. 5 - 8 % napadenih vej) opravite škropljenje s pripravkom **Movento SC 100** (1,9 L/ha), ki deluje tudi na izlegajoče ličinke vejičastega in ameriškega kaparja ali **Pirimor 50 WG** (0,75 kg/ha) z dodatkom močila oz. olja in škropljenje opravite z veliko količino vode (vsaj 800 L/ha). Oba pripravka delujeta tudi na listne uši.

OPOZORILO: PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRbite, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.

Pri strategiji obvladovanja krvave uši se nato v poletnih mescih (od 15. juniju dalje), ko je razvoj krvavkinega najezdnika – naravnega sovražnika krvave uši najbolj intenziven, izogibajte uporabe insekticidov.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

V zadnjih štirih dneh je na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 20 do 50 mm dežja.

Predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana, zato je glede na nadaljevanje nestanovitnega vremena, potrebno poskrbeti za ponoven nanos le te. Zaščita plodov s kontaktnimi fungicidi je zelo pomembna še posebno tam, kjer so na listih pege in je nevarnost sekundarnih okužb velika.

Pri škropljenju dajte prednost kontaktnim fungicidom osnovi a.s. kaptan: **Captan 80 WG** (2kg/ha) **Merpan 80 WDG** (1,88 kg/ha), **Orthocide 80 WG** (2 kg/ha), **Scab 80 WG** (1,9 kg/ha), **Scab 480 SC** (3,13 L/ha) ali **Merplus** (2 L/ha – letos se ne trži). Lahko uporabite tudi pripravek na osnovi a.s. dodin **Syllit 400 SC** (1,9 L/ha).

Opozorilo: Sredstva Syllit 400 SC se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

V ekološki pridelavi se lahko uporabi pripravek **Curatio** – žvepleno apnena brozga, ki deluje tudi na jablanovo pepelovko in ima dovoljenje za nujne primere, smejo ga uporabiti samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

V nasadih, kjer škrlupa ne najdete po ustalitvi vremena ponovno podaljšajte razmike med škropljenji na 10 do 14 dni.

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala **jablanove pepelovke** dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol specilal**, **Microthiol disperss**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Sulfar** ali **Azumo WG** (od BBCH 69), v odmerku 3 kg/ha oz. 3L/ha.

V nasadih, kjer opazate močnejši pojav jablanove pepelovke dodajte pripravke kot sta: **Luna experience** (0,75 L/ha) ali **Sercadis** (0,25 L/ha). V kombinaciji s kontaktnim fungicidom lahko uporabite tudi pripravek **Sercadis plus**. Za zatiranje jablanove pepelovke lahko uporabite tudi pripravek **Topas 100 EC** (0,5 L/ha). Prav tako bi bila smiselna uporaba kombinacije kontaktnih fundicidov in registriranih pripravkov na osnovi strobilurinov kot so: **Stroby WG** (0,2 kg/ha), **Zato 50 WG** (0,15 kg/ha) ali **Tercel** (2,5 kg/ha), ki pa se v letošnjem letu ne tržijo.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu, pepelasti plesni in jabolčnem zavijaču velja tudi za hruške.

Toča

V primeru toče opravite škropljenje s pripravki na osnovi aktive snovi kaptan kot so: **Captan 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC**.

Datum objave obvestila: 07.06.2023 10:40

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

