

60. KROMPIRJEVA PLESEN - 07.06.2023 16:02 - Zaključeno



V nekaterih nasadih zgodnjega krompirja se je začela pojavljati krompirjeva plesen. Ob napovedanem nadaljevanju nestanovitnega vremena je nevarnost za širjenje bolezni velika, zato priporočamo, da nasade zavarujete s fungicidom. Priporočamo predvsem rabo katerega od kombiniranih fungicidov s cimoksanilom. Pripravka **Carial flex** in **Reboot** imata 7-dnevno karencu in ju lahko uporabite tudi v zgodnjih sortah, ki jih boste čez kakšen teden začeli izkopavati. Fungicida **Proxanil 450 SC** in **Rival duo** imata 14-dnevno karencu. Če krompirja še ne boste izkopavali škropljenje ponovite čez približno 7 dni.

Pozorni bodite tudi na razvoj koloradskega hrošča. V primeru prerazmnožitve ličink v zgodnjih sortah, ki jih nameravate kmalu izkopavati, uporabite katerega od insekticidov s kratko karencu kot so **Asset five**, **Raptol koncentrat**, **Azatin EC** (vsi s karencu 3 dni) in **Neemazal T/S** (karencu je 4 dni). Zatirajte mlade ličinke, škropljenje opravite proti večeru ali zgodaj zjutraj, nikakor ne sredi dneva in ob močnem soncu.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 07.06.2023 16:02

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

