



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Krompir

/ 76. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU

76. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU - 08.06.2023 15:54 - Zaključeno



V krompirju v tem času v posevkih opazamo povečan pojav ličink **koloradskega hrošča**. Ukrepati začnemo, ko imamo prisotnih **15 do 20 ličink / grm**. Insekticide uporabimo zgodaj, ko je večina ličink še majhnih, zgodnje zatiranje je še posebej pomembno pri rabi bioloških pripravkov, s katerim škropimo takoj, ko opazimo izležene ličinke.

Za zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **BENEVIA** (0,125 L/ha), ****CORAGEN** (0,06 l/ha), **MOSPILAN 20 SG** (100 g/ha) ali ****VOLIAM** (60 mL/ha).

V ekološki pridelavi krompirja lahko uporabite pripravek **ASSET FIVE (6)** (0,38 l/ha), **AZATIN EC** (1,5 l/ha), **LASER PLUS** (0,04 l/ha), **NEEMAZAL T/S** ali **RAPTOL KONCENTRAT** (8 l/ha).

Letno skušamo insekticide uporabiti le dvakrat. Vsakič uporabite insekticid iz druge kemične skupine. Če uporabite dotikalne insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. V primeru uporabe sistemskih sredstev krompir zaščitimo za 3 – 5 tednov.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Datum objave obvestila: 08.06.2023 15:54

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

Seznam registriranih FFS

