



63. Obvestilo o varstvu solatnic pred solatno plesnijo - 12.06.2023 14:04 - Zaključeno



Na nekaterih sortah solate se je na spodnjih listih pričela pojavljati solatna plesen. Bolezen se je pričela pojavljati na rastlinah na prostem, na starih in mladih rastlinah. Za zatiranje solatne plesni so registrirani sledeči fungicidi: Amylo – X 1,5 – 2,5 kg/ha, Cuprablau Z 35 WG 1,5 kg/ha, Enervin 2 kg/ha, Infinito 1,6 L/ha, Polyram DF 1,2 kg/ha, Revus 0,6 l/ha, Mirador 250 SC 1,0 L/ha, Ortiva 1,0 L/ha Zafra ATZ 250 SC 1,0 L/ha, Zoxis 250 SC 1,0 L/ha, fungicid Taegro 0,185 - 0,37 kg/ha, ki se uporablja za zmanjševanje okužb. Največ 12x (skupni odmerek do 4,44 kg/ha) v zaščitnih prostorih ali 10x (skupni odmerek do 3,7 kg/ha) na prostem.

Samo v zaščitnih prostorih je registriran še Previcur Energy v odmerku 2,5 l/ha po presajanju oz. z zalivanjem 3 ml/m² za solato gojeno v organskem substratu. Zaradi ostankov aktivne snovi propamokarb v pripravku Previcur Energy v tleh se korenovke in čebulnice, namenjene prehrani ljudi in živali, sme saditi oziroma sejati šele po preteku 120 dni od zadnjega tretiranja. Listnate in stebelne vrtnine, plodovke ter kapusnice pa 60 dni po zadnjem tretiranju.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, TER PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 1. IN 2. REDA. VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, PRAVILNO HRANITI PRIPRAVKE IN EMBALAŽO.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 12.06.2023 14:04

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

