



## 66. VARSTVO VINSKE TRTE - 19.06.2023 11:59 - Zaključeno



Na toplejših legah je cvetenje že povsem zaključeno, zaradi suhega in toplega vremena pa lahko pričakujemo, da bo trta hitro odcvetela tudi drugod. Trenutne vremenske razmere so manj ugodne za razvoj **peronospore**, vendar se bo nevarnost za okužbe ob koncu tedna, ko so napovedane nove padavine, spet povečala, zato je potrebno nadaljevati s preventivnim varstvom. Več okužb lahko pričakujemo predvsem v vinogradih, kjer se je bolezen v letošnjem letu že pojavila. Tam priporočamo uporabo kombiniranih kontaktnih in sistemskih oz. polsistemskih pripravkov kot so **Allum**, **Ampexio**, **Cymbal**, **Folpan Gold**, **Forum star**, **Magma triple WG**, **Mikal flash**, **Mikal premium F**, **Momentum F**, **Momentum trio**, **Orondis**, **Orondis ultra**, **Orvego**, **Pergado D**, **Pergado F**, **Pergado SC**, **Profiler**, **Reboot**, **Revus**, **Sanvino**, **Sfinga Extra WDG**, **Twingo**, **Zorvec Vinabel** ali **Zorvec Zelavin**. Drugod lahko za naslednje škropljenje uporabite katerega od kontaktnih pripravkov kot so **Daimyo F**, **Enervin**, **Videryo F**, **Vincy F**, **Delan Pro**, **Follow 80 WG**, **Folpan 80 WDG**, **Solofol**, **Polyram DF**, **Cabrio top** ali **Universalis** (slednja delujeta tudi proti oidiju). Za varstvo trt v ekološki pridelavi uporabite pripravke na osnovi **bakra**. Pri uporabi kontaktnih pripravkov bodite še posebej pozorni na količino padavin, saj se predvideva, da je pri količini več kot 20 mm dežja fungicidna obloga sprana in je treba nanos ponoviti. V vsakem primeru je zaradi intenzivnega prirasta mladice in razvoja grozdličev škropljenja s kontaktnimi pripravki priporočljivo izvajati v tedenskih časovnih intervalih.

Po cvetenju so razvijajoče se jagode zelo dovzetne za okužbe z **oidijem**. Za razvoj povzročitelja ni potrebna prisotnost proste vode (vodni film na površini listov in grozdličev) in za širjenje okužb zadostuje že višja relativna zračna vlaga ter temperature okrog 25-30 °C. Okužbam so tako bolj izpostavljene trte na senčnih, neprevetrenih legah ter občutljive sorte kot so npr. Chardonay, Malvazija, Modra frankinja... Za preprečevanje okužb svetujemo uporabo sistemskih oz. polsistemskih pripravkov kot so **Collis**, **Custodia**, **Difcor 250 EC**, **Domark 100 EC**, **Dynali**, **Folicur EW 250**, **Luna experience**, **Luna max**, **Mavita**, **Mystic 250 EC**, **Nativo 75 WG**, **Orius 25 EW**, **Prosper CS 300**, **Revyona**, **Score 250 EC**, **Sercadis**, **Spirox**, **Spirox D**, **Talendo extra**, **Tebusha 25%EW**, **Topas 100 EC**, **Unicorn DF** ali **Vivando**, ki jim dodajte tudi **žveplovo pripravek** v zmanjšanem odmerku. V ekološki pridelavi lahko namesto žvepla uporabite sredstva na podlagi mikroorganizmov kot so **AQ 10**, **Sonata**, **Taegro** ali pripravek **Karbicare** oz. **Vitisan** (kalijev hidrojen karbonat).

V primeru poškodb vinogradov zaradi toče je priporočljiva prednostna uporaba kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo a.s. folpet (npr. **Forum star**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F**, **Folpan gold**, **Mikal flash** ipd.) ali kontaktnih pripravkov na osnovi folpeta: **Follow 80 WG**, **Folpan 80 WDG** in **Solofol**.

Ob visokih dnevnih temperaturah zraka (nad 25 °C), svetujemo, da opravite škropljenje v jutranjem ali večernem času, ko je nanos škroplilne brozge boljši in manjša možnost pojava fitotoksičnosti. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 19.06.2023 11:59

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

Seznam registriranih FFS

