

68. VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC - 22.06.2023 13:48 - Zaključeno



Zgodnje sorte ameriških borovnic že zorijo. Tekom zorenja je potrebno spremljati nalet plodove vinske mušice in po potrebi ukrepati z insekticidom. Nalet mušice lahko spremljate s pomočjo doma narejenih prehranskih vab.

V 0,5 L plastenko na zgornjem delu izvrtajte 4 do 5 luknjic, katerih premer naj ne bo večji od 5 mm in zgornji del plastenke pobarvajte z rdečo barvo. V plastenko nalijete 1 dl raztopine jabolčnega kisa in rdečega vina v razmerju razmerje 3:1 z dodanim sladkorjem (1 čajna žlička sladkorja /1 l raztopine). Vabo obesite v notranjost krošnje cca. 1 m od tal.

V času dozorevanja plodov redno pregledujte vabe in ob pojavu škodljivca ukrepajte z enim izmed registriranih insekticidov (**Laser 240 SC**, **Laser Plus** in **Asset Five**). Vsi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Na poznih sortah je še vedno čas za ukrepanje proti širjenju sekundarnih okužb s sivo plesnijo. Priporočamo uporabo biotičnih pripravkov, ki imajo kratko oz. so brez karenčne dobe. Na voljo sta pripravka **Taegro** in **Serenade ASO**, ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Pri uporabi sredstev nevarnim čebelam in drugim opraševalcem, je potrebno pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Preberite sredstvom priložena navodila za uporabo in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 22.06.2023 13:48

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

[Seznam registriranih FFS](#)

