



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Vinska trta

/ 74. OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA – drugo in tretje zatiranje v EKOLOŠKIH vinogradih

74. OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA – drugo in tretje zatiranje v EKOLOŠKIH vinogradih - 30.06.2023 07:01 - Zaključeno



Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije večinoma v razvojni fazi BBCH 73 (jagode velikosti prosenih zrn; grozdčki se začnajo povešati) – BBCH 75 (jagode velikosti graha, grozdčki povešeni).

V ekoloških vinogradih v celotnem razmejenem območju so letos proti amerškemu škržatku obvezna tri tretiranja. Zdaj je nastopil čas za **DRUGO OBVEZNO ZATIRANJE ameriškega škržatka** (*Scaphoideus titanus* Ball.) - **prenašalca zlate trsne rumenice**. **Škropljenje naj bo opravljeno v času med 1. in 11. julijem!** Pred uporabo insekticida je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu.

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s **pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (UL RS, št. 48/14, 49/16 in 8/17) OBVEZNO ZA VSE** imetnike vinske trte in sicer:

- v **vinogradih** za pridelavo grozdja ter **na brajdah in ohišnicah** v razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v okuženih območjih, varovalnih pasovih in žariščih okužbe (**območje Štajerske in Prekmurja**).

- v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Sloveniji.

OPOZARJAMO vinogradnike, da je zaradi slabšanja stanja okužb z zlato trsno rumenico obvezno število škropljenj v letošnjem letu višje kot v prejšnjih letih. Poudarjamo, da je za učinkovito preprečevanje širjenja ključnega pomena pravočasno in dosledno zatiranje prenašalca ameriškega škržatka z insekticidi in tudi odstranjevanje okuženih trt.

Za **DRUGO ZATIRANJE** ameriškega škržatka je mogoče uporabiti **Flora verde** (3 krat letno) ali **Biotip floral** v 1,6 l/ha (3 krat letno), ki sta registrirana tudi proti grozdnim sukačem. Drugo tretiranje opravimo **7 do 10 dni po prvem tretiranju**. Za doseganje boljše učinkovitosti priporočamo, da se zniža Ph škropilne brozge pod 6,0. Uporabite lahko sredstva kot so pH minus itd.

TRETJE OBVEZNO tretiranje opravimo 7 do 10 dni po drugem!!!

Več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: <https://www.gov.si teme/zlata-trsna-rumenica/>

Pred uporabo pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 30.06.2023 07:01

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

Seznam registriranih FFS

