

Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Vinska trta

/ 77. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV: Ameriški škrdžatek (rumene lepljive plošče)

77. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV: Ameriški škrdžatek (rumene lepljive plošče) - 07.07.2023**08:16 - Zaključeno**

Vinska trta je v severovzhodnem delu Slovenije dosegla fenofazo 75 (jagode velikosti graha, grozdčki povešeni).

Od 24. junija do 3. julija je bil čas za prvo škropljenje ameriškega škrdžatka (*Scaphoideus titanus*), prenašalca zlate trsne rumenice. Večinoma se ameriški škrdžatek trenutno nahaja v L3 in L4 stadiju, vendar smo v teh dneh našli tudi že prve ličinke L5 stadija, kar pomeni, da kmalu pričakujemo že prve odrasle primerke. Zato **priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč** s katerimi spremljamo populacijo odraslih osebkov ameriškega škrdžatka in s tem preverjamo učinkovitost opravljenega škropljenja.

VINOGRADI

Spremljanje ameriškega škrdžatka je priporočljivo po celotni SV Sloveniji, tudi v brajdah in ohišnicah. Rumene lepljive plošče izobesimo v **sredino vinograda**, v **senčni del** trte na žico ali trto (škrdžatki se najraje zadržujejo v senci. Pazimo, da se plošče ne prilepijo na listje trte.

Število rumenih lepljivih plošč glede na površino vinograda:

Površina	Število rumenih lepljivih plošč
do 2 ha	3
2 do 5 ha	6
nad 5 ha	9

V brajdah in ohišnicah izobesimo vsaj 2 rumeni lepljivi plošči.

Rumene lepljive plošče pregledujemo 1 x tedensko in ulov redno beležimo. Plošče menjujemo na 14 dni. Ulov spremljamo do konca avgusta.

MATIČNI VINOGRADI, MATIČNJAKI IN TRSNICE

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škrdžatka **OBVEZNO**. Pravila za postavitev in število rumenih lepljivih plošč so enaka kot pri postavitvi v vinogradih za pridelavo grozdja. Ulov spremljamo do sredine septembra.

O optimalnem terminu in priporočenih pripravkih za drugo in tretje tretiranje vas bomo obvestili v naslednjih obvestilih.

Več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škrdžatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: <https://www.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrana/varstvo-rastlin/zdravje-rastlin/bolezni-in-skodljivci-rastlin/zlata-trsna-rumenica/>

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 07.07.2023 08:16

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

