



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Vinska trta
/ 78. OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA – drugo tretiranje

78. OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA – drugo tretiranje - 07.07.2023 08:19 - Zaključeno



Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma v fazi dotikanja jagod – BBCH 75 (jagode velikosti graha)

Nastopil je čas za **DRUGO ZATIRANJE ameriškega škržatka** (*Scaphoideus titanus* Ball.) - **prenašalca zlate trsne rumenice**. **Škropljenje naj bo opravljeno v času med 10. in 20. julijem!** Pred uporabo insekticida je treba pokositi oz. pomulčiti cvetočo podrast v vinogradu.

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s **pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (UL RS, št. 48/14, 49/16 in 8/17) OBVEZNO ZA VSE** imetnike vinske trte in sicer:

- **v vinogradih** za pridelavo grozdja ter **na brajdah in ohišnicah** v razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v okuženih območjih, varovalnih pasovih in žariščih okužbe (**območje Štajerske in Prekmurja**).

- v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Sloveniji.

OPOZARJAMO vinogradnike, da je zaradi slabšanja stanja okužb z zlato trsno rumenico obvezno število škropljenj v letošnjem letu višje kot v prejšnjih letih in je določeno po občinah. Zato morajo vinogradniki preveriti, v kateri občini se nahaja njihov vinograd. Obvezno število tretiranj po občinah je navedeno v tabeli spodaj. Poudarjamo, da je za učinkovito preprečevanje širjenja ključnega pomena pravočasno in dosledno zatiranje prenašalca ameriškega škržatka z insekticidi in tudi odstranjevanje okuženih trt.!!

Za **DRUGO ZATIRANJE** ameriškega škržatka priporočamo uporabo sledečih insekticidov; **Sivanto prime** v odmerku 0,5 l/ha (1 krat letno), **Movento SC 100** v odmerku 0,7 L/ha (2 krat letno), **Decis 2,5 EC** v odmerku 0,5 L/ha (1 krat letno), **Decis 100 EC** v odmerku 0,75 L/ha (1 krat letno) ali **Mavrik 240 EW** v odmerku 0,2 L/ha (2 krat letno). Prednost dajemo pripravku Sivanto prime, če ga nismo uporabili že pri prvem tretiranju, ali Movento SC 100.

ŠTEVILO POTREBNIH TRETIRANJ:

1. **V vinogradih** za pridelavo grozdja v okuženem območju in v varovalnem pasu v severovzhodni Sloveniji (Štajerska in Prekmurje):

Območje in institucija	Občine	Število obveznih tretiranj letno
Okuženo območje v Prekmurju KGZS - Zavod Maribor	Lendava, Dobrovnik	3 tretiranja
Okuženo območje in varovalni pas KGZS - Zavod Maribor	Ljutomer, Ormož, Razkrižje, Sveti Tomaž, Sveti Jurij ob Ščavnici, Trnovska vas, Destrič	3 tretiranja
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (ob okuženem območju, Štajerska) KGZS - Zavod Maribor	Sveti Andraž, Juršinci, Gorišnica, Dornava	3 tretiranja
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (ob okuženem območju, Štajerska) KGZS - Zavod Maribor	Zavrč, Cirkulane, Markovci, Ptuj, Duplek, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Radenci, Križevci	3 tretiranja; če inetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju uvojeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Prekmurje) KGZS - Zavod Maribor	Moravske toplice, Puconci, Kobilje	3 tretiranja; če inetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju uvojeni

Območje in institucija	Občine	Število obveznih tretiranj na eno plosčico na teden, 3. tretiranje ni treba opraviti
Várovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska) KGZS – Zavod Maribor	Veržej, Križevci, Apače, Sveta Ana, Šentilj, Kungota, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Benedikt, Maribor, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Videm, Kidričevo, Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Majšperk, Podlehnik, Oplotnica, Žetale, Središče ob Dravi	2 tretiranja
Várovalni pas vključno z žarišči okužbe (Prekmurje) KGZS - Zavod Maribor	Tišina, Murska Sobota, Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana, Turnišče, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš	2 tretiranja
Várovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije	Bistrica ob Sotli	3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škrtatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škrtatki na eno ploščico na teden, 3. tretiranje ni treba opraviti.
Várovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije	Zreče, Vojnik, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje	2 tretiranja

Ulov odraslih ameriških škrtatkov na rumene lepljive plošče začnemo spremljati po prvem opravljenem tretiranju.

• ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA V MATIČNIH VINOGRADIH, MATIČNJAKIH IN TRSNICAH

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je **obvezno zatiranje ameriškega škrtatka povsod po Sloveniji**, to je v razmejenih območjih in izven njih.

Za **DRUGO škropljenje v MATIČNIH VINOGRADIH** priporočamo uporabo sledečih insekticidov; **Sivanto prime** (1 krat letno), **Movento SC 100** (2 krat letno), **Decis 2,5 EC** (1 krat letno) ali **Decis 100 EC** (1 krat letno). Prednost se daje pripravku Sivanto prime, ki je sistemski insekticid z rezidualnim delovanjem. Uporabi se lahko le enkrat v isti rastni sezoni. S pripravkom Movento SC 100 hkrati zatiramo tudi trtno uš. V matičnih vinogradih je potrebno paziti na karenčno dobo. S pripravkom Decis 2,5 EC zatremo tudi grozdne sukače.

Za **DRUGO škropljenje v MATIČNJAKIH in TRSNICAH** priporočamo uporabo sledečih insekticidov; **Mospilan 20 SG** (1 krat letno), **Sivanto prime** (1 krat letno), **Movento SC 100** (2 krat letno) ali **Decis 2,5 EC** (2 krat letno).

O optimalnem terminu in priporočenih pripravkih za tretje tretiranje vas bomo obvestili v naslednjih obvestilih.

OBVEZNO je tudi spremljanje ulova ameriškega škrtatka na rumene lepljive plošče od začetka julija. Ce je na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en škrtatek, je treba opraviti še četrto tretiranje. To tretiranje je namenjeno predvsem zatiranju škrtatkov, ki v matični vinograd, matičnjak ali trsnico priletijo iz okolice.

• APLIKACIJA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Cvetoča podrast v vinogradih mora biti v času tretiranja z insekticidi, zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Aplikacija mora biti izvedena na način, da se prepreči zanašanje škroplilne brozge na sosednje parcele.

Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov priporočamo njihovo uporabo v večernih oziroma nočnih urah. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša.

Insekticidov na osnovi a.s. piretrin (Flora verde in Biotip floral) se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporočena se uporaba v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škrtatek. Pripravki iz skupine piretroidov za dobro delovanje potrebujejo ustrezen pH in sicer pod 6,5.

Da dosežemo **dobro omočenje rastlin** in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha) in uporabo

močil. Učinkovitost sredstev za zatiranje ameriškega škrtatka je zelo odvisna od učinkovitega nanosa, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov.

Za pripravek **Movento SC 100** priporočamo samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škrtatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škrtatka opravite šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).

Več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škrtatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: <https://www.gov.si teme/zlata-trsna-rumenica/>

Pred uporabo pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 07.07.2023 08:19

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024