



Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Vinska trta
/ 70. Napoved za drugo zatiranje in začetek spremljanja ameriškega škrdatka

70. Napoved za drugo zatiranje in začetek spremljanja ameriškega škrdatka - 10.07.2023 15:38 - Zaključeno



Tri tedne po 1. tretiranju je običajno čas za drugo uporabo insekticida za zatiranje ameriškega škrdatka – prenašalca zlate trsne rumenice. V vinogradih za pridelavo grozdja v varovalnem pasu razmejenega območja za zadrževanje je število obveznih tretiranj določeno glede na stanje okužb in je določeno po občinah. Natančni podatki o številu tretiranj po občinah so objavljeni v seznamih, ki so del Načrta ukrepov za zlato trsno rumenico in so dostopni na spletni povezavi.

Pri drugem tretiranju dajemo prednost pripravku **Sivanto prime**, če ga nismo uporabili že pri prvem tretiranju. Če je bil pri prvem tretiranju uporabljen insekticid **Mospilan 20 SG** ali **Sivanto prime**, za drugo tretiranje priporočamo uporabo pripravka **Movento SC 100** ali **Decis 2,5** ali **Decis 100 EC** ali **Mavrik 240 EW**.

V primerih, ko je treba opraviti še 3. tretiranje imajo prednost kontaktni pripravki: Biotip floral, **Flora verde** ali **Decis 100 EC** ali **Mavrik 240 EW**. Uporabimo lahko tudi pripravek **Sivanto prime**. Pri tem je treba upoštevati, da se lahko **Sivanto prime** uporabi samo 1 x v sezoni. Če so vremenske razmere ustrezne – če je zračna vlaga visoka, npr. takoj po dežju, lahko uporabimo tudi pripravek **Movento SC 100**, ki ga lahko uporabimo 2 x v rastni sezoni.

V ekološki pridelavi so na celotnem razmejenem območju obvezna najmanj 3 tretiranja s sredstvi na osnovi piretrina, ki jim je priporočljivo dodati ustrezno močilo oz. adjuvant.

Vinogradnike tudi obveščamo, da se v vinogradih že pojavljajo odrasli osebk ameriškega škrdatka, zato je sedaj skrajni čas, da izobesite rumene lepljive plošče (RLP) za njegovo spremljanje. V vinogradih za pridelavo grozdja je spremljanje ameriškega škrdatka priporočljivo, saj tako lahko sami preverimo učinkovitost opravljenih ukrepov zatiranja. V vinogradih za pridelavo grozdja v določenih občinah, ki so navedene v prilogi 2 Načrta ukrepov, je glede na stanje ulova odraslih škrdatkov možno zmanjšati število tretiranj, če vinogradnih sam spremlja ulov ameriškega škrdatka. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na območju celotne Slovenije pa je spremljanje ameriškega škrdatka obvezno. Na splošno pa je za poznavanja stanja v vinogradih za pridelavo grozdja priporočljivo, da vinogradniki spremljajo ulov ameriškega škrdatka tudi izven razmejenih območij.

Način spremljanja ameriškega škrdatka z RLP: V sredino vinograda, matični vinograd, trsnico ali matičnjak izobesimo najmanj 3 RLP. Če je površina večja od 2 ha, število plošč ustrezno povečamo (6 RLP na 2-5 ha oz. 9 RLP v vinogradih večjih od 5 ha). Plošče izobesimo v senčni del trte na žico ali trto, ker se škrdatki najraje zadržujejo v senci. V trsnici izobesimo plošče na količke, ki jih postavimo na grebenih. RLP pregledujemo 1 x tedensko in jih menjamo na 14 dni. Ulov redno beležimo. V vinogradih za pridelavo grozdja spremljamo ulov do konca avgusta, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa do sredine septembra.

Datum objave obvestila: 10.07.2023 15:38

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

Seznam registriranih FFS

