



90. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 17.07.2023 11:42 - Zaključeno



Plodovi v nasadih jablan in hrušk presegajo polovico končne velikosti (76 po lestvici BBCH).

Redno varstvo pred **jablanovim škrlupom** vzdržujte na 10 do 14 dni, oz. prilagodite na morebitne padavine. Ob nevihtah z intenzivnimi nalivi (30 in več l/m²), ki hitro izperejo fungicidno oblogo, je potrebno nanos obnoviti. Še naprej priporočamo preventivno delujoče pripravke: **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **DELAN 70 WG** (0,75 kg/ha),... **KARBICURE** (5 kg/ha), **VITISAN** (7,5 kg/ha) ali **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Zadnji trije pridejo v poštev tudi za varstvo nasadov v ekološki pridelavi in imajo delovanje še na nekatera druga glivična obolenja.

Okužbe s povzročitelji **listnih pegavosti** na jablani (*Marssonina coronaria*, *Colletotrichum* oz. *Alternaria* kompleksi) preprečujte z izmenjujočimi nanosi **VITISAN** (7,5 kg/ha), oz. **KARBICURE** (5 kg/ha), **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha) ter **PRIPRAVKI NA OSNOVI ŽVEPLA** (do 5-8 kg/ha). Navedene bolezni se najpogosteje pojavljajo v nasadih z ekološkim načinom pridelave, neredko pa jih zasledimo tudi drugod. Opisani pristop ima zaviralni učinek še na razvoj in **mušje pegavosti** in **sajavosti plodov**.

Poganjke okužene z **jablanovo pepelovko** izrežite in ročno odstranjujte iz nasada. Priporočamo tudi redno dodajanje **sredstev na osnovi žvepla** (4 – 6 kg/ha, oz. l/ha)

V primeru neurja s točo počakamo, da se rastline osušijo ter opravimo varstvo s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov **kaptan** (Captan, Merpan, Orthocide, Scab, Merplus).

Če med spremljanjem stanja v nasadu zasledite povečano številčnost **marmorirane smrdljivke**, pride v poštev ukrepanje s pripravkom **MOSPILAN 20 SG** (0,5 kg/ha; največ 2 × v rastni dobi), kateri je predviden tudi proti **listnim ušem** in **gosenicam zavijačev**. Zoper njo so registrirani še dotikalno delujoči: **ASSET FIVE** (0,96 l v 1.500 l vode; oz. 0,064 % konc.; največ 3 × v rastni dobi; ima izjemno dovoljenje za primere varstva rastlin), **DECIS 100 EC** (75 ml/ha, ob porabi vode 1500 l; največ 1 × v rastni dobi), **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha; največ 2 × v rastni dobi), **KARATE ZEON 5 CS** (0,018 % konc.; največ 2 × v rastni dobi). Uporaba slednjih sredstev v vročem vremenu ne pride v poštev. Posebno je potrebno paziti na varstvo čebel in vodnih virov. Na nalete stenik odvrtačno vpliva še nanos **pripravkov na osnovi žvepla** in **kaolinskih glin** (KUTISAN, MALUSAN,...).

Pridelovalce obveščamo o pojavljanju drugega rodu **jabolčnega zavijača**. Za varstvo priporočamo **AFFIRM** (1 kg/ha na 1 m višine krošnje; največ 4 kg/ha), **AFFIRM OPTI** (2 kg/ha), **DELEGATE 250 WG** (0,3 kg/ha; le 1 × v rastni dobi), **LASER PLUS** (0,3 l/ha; le 1 × v rastni dobi), oz. **MADEX MAX** (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) ali **CARPOVIRUSINE** (1 l/ha). Zadnji trije so primerni tudi v ekološki pridelavi.

Izvedba zaščite je smiselna zlasti iz vidika pojavljanja tudi **drugih vrst zavijačev**. Izstopa drugi rod **breskovega zavijača** in občasno pojavljanje **koruzne veščice**. Zoper slednje lahko uporabite še sredstva na osnovi *Bacillus thuringiensis*: **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha), **DELFIN WG** (0,75 kg/ha) ali **AGREE** (1 kg/ha).

Ob aktualnih vremenskih razmerah je pomembno tudi spremljanje populacij **rdeče sadne** in **navadne pršice**. V kolikor prihaja do prereznožitve (6-7 gibljivih osebkov na list), priporočamo uporabo: **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje) ali **SHIRUDO** (0,5 kg/ha).

Nanos opravite v večernem času, ko začnejo temperature padati in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 17.07.2023 11:42

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: Domen Bajec

Seznam registriranih FFS

