



93. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 17.07.2023 11:48 - Zaključeno



V času zorenja breskev in nektarin svetujemo zlasti v primeru neurij z možnostjo fizičnih poškodb na plodovih preventivno varstvo pred **sadno gnilobo**. Uporabite lahko: **SIGNUM** (0,75 kg/ha; karenc 7 dni), **MAMTA 250 EC** (0,45 l/ha; karenc 7 dni), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha; 14 dni karenc), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha; karenc 7 dni), **CHORUS 50 WG** (0,6 kg/ha; karenc 7 dni), **LIBRETO** (1 l/ha; delovna karenc: ko se škropilna brozga popolnoma posuši, je dovoljen vstop na delovne površine), **REVVONA** (1,8 l/ha; karenc 3 dni), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha; karenc 7 dni), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha; karenc 14 dni), **TELDOR SC 500** (1 l/ha; karenc 3 dni), oz. pripravke, ki zmanjšujejo možnost okužb in so sprejemljivi tudi v ekološki pridelavi: **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha; karenc ni potrebna), **TAEGR0** (0,185-0,37 kg/ha; karenc 1 dan), **KARBICURE** (5 kg/ha; karenc 1 dan; tretira se od razvojne faze, ko večina plodov doseže 90 % končne velikosti ploda (BBCH 79), do faze užitno zrelih plodov (BBCH 89).

Pri varstvu pred breskovim zavijačem in moljem pridejo v poštev: **CORAGEN** (18-20 ml/hl; 14 dni karenc), **VOLIAM** (18-20 ml/hl; 14 dni), **AFFIRM** (3 – 4 kg/ha; 7 dni), **DELEGATE 250 WG** (0,3 kg/ha; 7 dni), **LASER PLUS** (0,25 l/ha; 7 dni), **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha; karenc ni potrebna), **AGREE WG** (1 kg/ha; karenc ni potrebna); zadnji trije so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 17.07.2023 11:48

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

