



86. Varstvo vinske trte - 22.08.2023 06:56 - Zaključeno



Pri poznejših sortah vinske trte lahko grozde še vedno zavarujete s pripravki, ki preprečujejo ali zavirajo razvoj sive grozdne plesni – botritisa. Okužbe se v vlažnem vremenu hitro širijo, zato je škropljenje potrebno opraviti preventivno pred naslednjimi dolgotrajnejšimi padavinami. Ukrep je smiseln zlasti v vinogradih, kjer je grozdje poškodovano zaradi toče. Na voljo so naslednji pripravki – botriticidi: **Cantus** (28 dni karence), **Libreto** (14 dni), **Mythos** (21 dni), **Prolectus** (14 dni), **Pyrus 400 SC** (35 dni), **Scala** (21 dni), **Switch 62,5 WG** (21 dni), **Teldor SC 500** (14 dni) ali **Zenby** (21 dni). Za zmanjševanje okužb lahko uporabite tudi pripravka **Orocid plus** ali **Prev-gold** (oba 1 dan karence). Na voljo so tudi pripravki na osnovi mikroorganizmov s krajšo karencio (do 1 dan) kot so: **Amylo-X**, **Botector** ali **Serenade ASC** (le za namizno grozdje), **Polyversum**, **Taegro** ali **Univerzalni fungicid**, ki so dovoljeni so tudi v ekološki pridelavi. Nanos botriticidov lahko opravite le v območju grozdov in temu ustrezno prilagodite tudi odmere pripravkov ter količino vode. Nanos škroplilne brozge je boljši, če pred tem opravite delno razlitanje in zagotovite dobro omočenost grozdov.

V času zorenja grozdja škodo pogosto povzroča tudi plodova vinska mušica. Škodljivcu ustreza toplo in vlažno vreme, zato na zorečem sadju v letošnjem letu beležimo velike populacije mušic. Pojav mušice v vinogradih lahko spremljate s pomočjo prehranskih vab. Vabe si lahko izdelate sami, tako da v politrsko plastenko z izvrtanimi luknjicami (do 5 mm) na zgornjem delu nalijete 1 dl mešanice jabolčnega kisa in rdečega vina v razmerju 3:1, z dodano žličko sladkorja in nekaj kapljic detergenta. Vabe pregledujte dnevno oz. po potrebi. Več o škodljivcu si lahko preberete na spletni povezavi: <https://www.ivr.si/skodljivec/plodova-vinska-musica/>. V primeru prerazmnožitve populacije lahko na vinski trti za zatiranje plodove vinske mušice uporabite insekticida **Laser 240 SC** ali **Laser plus**, ki imata 14 dni karence.

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja! V fazi dozorevanja grozdja bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov. Zaradi varstva čebel in drugih opraševalcev pred škropljenjem z insekticidi v vinogradu odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zvečer oz. v času, ko so čebele v panju.

Datum objave obvestila: 22.08.2023 06:56

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

Seznam registriranih FFS

