

108. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 23.10.2023 13:18 - Zaključeno



Na površinah, kjer ste letos beležili pogostejše poškodbe **jabolčnega** in **drugih vrst zavijačev**, je v jeseni priporočljivo opraviti zaščitna tretiranja z **entomopatogenimi ogorčicami**. To velja zlasti za nasade z ekološkim načinom pridelave sadja. Uporabite lahko pripravke **NEMOPAK SC** (50 mio v pakiranju; 50 mio/300m²), **NEMOPAK SC 500** (500 mio v pakiranju) s *Steinernema carpocapsae* ali **NEMAPOM** (odmerek 3 vrečke s po 500 mio/ha) s *Steinernema feltiae*, ki so domorodni organizmi za namene biotičnega varstva rastlin.

Delovanje ogorčic je usmerjeno na prezimivni stadij zavijačev, zmanjšuje njihovo številčnost ter pripomore k lažjemu varstvu nasadov v naslednji rastni dobi. Ogorčice so živ organizem, ki potrebujejo za delovanje ter obstoj razmere z visoko vlago (megleno in deževno vreme) in dnevne temperature nad 10° C. Najugodnejši so deževni dnevi z nizko intenzivnostjo padavin. Zaželeno je, da so deli tretiranih rastlin omočeni vsaj nekaj ur, kratkotrajen padec temperature pa na učinkovitost nima vpliva.

Za pravilen nanos uporabite šobe z večjim premerom (vsaj 1 mm), obvezno odstranite filtre finejše od 1 mm ter zmanjšajte pritisk na največ 10-15 bar. Potrebna je velika poraba vode (1.500 – 2.000 l/ha) in odprte le spodnje 2 do 3 šobe, ki bodo pokrile debla dreves do prvih ogrodnih vej, korenski vrat in tla pod krošnjo. Poskrbite za stalno mešanje škropilne suspenzije.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 23.10.2023 13:18

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

