

110. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 30.10.2023 19:03 - Zaključeno



V nasadih, kjer so letos **jabolčni** in **druge vrste zavijačev** povzročale opaznejše težave na pridelku (zlasti nasadi v ekološki pridelavi), je v jeseni priporočljivo opraviti zaščitna tretiranja z **entomopatogenimi ogorčicami**. Uporabite lahko pripravke **NEMOPAK SC** (50 mio v pakiranju; 50 mio/300m²), **NEMOPAK SC 500** (500 mio v pakiranju) s *Steinernema carpocapsae* ali **NEMAPOM** (odmerek 3 vrečke s po 500 mio/ha) s *Steinernema feltiae*, ki so domorodni organizmi za namene biotičnega varstva rastlin. Delovanje ogorčic je usmerjeno na prezimitveni stadij zavijačev, zmanjšuje njihovo številčnost ter pripomore k lažjemu varstvu nasadov v naslednji rastni dobi. Ogorčice so živ organizem, ki potrebujejo za delovanje ter obstoj razmere z visoko vlago (megleno in deževno vreme) in dnevne temperature nad 10° C. Najugodnejši so prihajajoči deževni dnevi z nizko intenzivnostjo padavin. Zaželeno je, da so deli tretiranih rastlin omočeni vsaj nekaj ur, kratkotrajen padec temperature pa na učinkovitost nima vpliva.

Za pravičen nanos uporabite šobe z večjim premerom (vsaj 1 mm), obvezno odstranite filtre finejše od 1 mm ter zmanjšajte pritisk na največ 10-15 bar. Potrebna je velika poraba vode (1.500 – 2.000 l/ha) in odprte le spodnje 2 do 3 šobe, ki bodo pokrile debla dreves do prvih ogrodnih vej, korenski vrat in tla pod krošnjo. Poskrbite za stalno mešanje škropilne suspenzije.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 30.10.2023 19:03

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

