



112. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 07.11.2023 15:08 - Zaključeno



Pridelovalcem jabolk in hrušk svetujemo, da z zaključevanjem rastnega obdobja v nasadih ob odpadanju listja poskrbite za preventivno varstvo ran, ki nastanejo zaradi defoliacije ali drugih poškodb na skorji.

Za zmanjšanje možnosti okužb lesa z **glivičnimi** (*jablanov rak*, *gniloba koreninskega vratu*,...) in **bakterijskimi obolenji** (*hrušev ožig*) svetujemo ob začetku odpadanja listja nanos bakrovih pripravkov. Njihova uporaba bo znižala tudi infekcijski potencial **jablanovega** in **hruševega škrlupa**. Izbirate lahko med pripravki: **CUPRABLAU Z 35 WG** (za zatiranje *jablanovega škrlupa* 3 kg/ha, oz. *gnilobe koreninskega vratu*: tretiranje posamičnih okuženih dreves v odmerku 15 – 35 g na 100 l vode, ob porabi 0,1 do 0,15 l vode na drevo), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha; proti *jablanovemu škrlupu*), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2 kg/ha; proti *jablanovemu škrlupu*) ali **KOCIDE 2000** (2 kg/ha; proti *jablanovemu škrlupu*), **BADGE WG** (2,9 kg/ha; proti *hruševemu ožigu*), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha; le proti *jablanovemu raku*).

Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri nizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.

Datum objave obvestila: 07.11.2023 15:08

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

