



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Oljna ogrščica
/ 5. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI

5. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI - 20.02.2024 07:32 - Zaključeno



Oljna ogrščica je v SV Sloveniji v fazi podaljševanje stebela. Ulove kljunotajev redno spremljamo, podatki so prikazani v spodnji preglednici. Na opazovanih mestih se lovi majhen Stebelni kapusov kljunotaj .

Pragovi škodljivosti so na nekaterih lokacijah preseženi!

PRAGOVİ ŠKODLJIVOSTI pri kljunotajih so:

- velik **Ogrščični (repični) kljunotaj (*Ceutorhynchus napi*): 5 hroščev/posodo na 3 dni;**
- majhen **Stebelni kapusov kljunotaj (*Ceutorhynchus quadrienz*): 15 hroščev/posodo/ 3 dni.**

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh. V kolikor imate v vaših posevkih presežen prag škodljivosti priporočamo zatiranje kljunotajev.

Kljunotaje je potrebno zatreti v nekaj dneh, ko je presežen prag škodljivosti. **Pri piretroidih upoštevamo pH škropilne brozge, ki naj okoli 5,5 - 6,5**, za zatiranje kljunotajev priporočamo piretroide iz II. skupine. Priporočamo, da poškopite v večerno nočnem času.

Preglednica 2: Seznam insekticidov registriranih za oljno ogrščico

SREDSTVO	ODMEREK	ČAS UPORABE	REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE
PIRETROIDI TIPA I			
Evure (Tau-fluvalinat 24%)	0,2 L/ ha	Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti	za zatiranje repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> , <i>C. piciparis</i>), repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>), redkvinega kljunotaja (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) in kapusove luske hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>).
Mavrik 240 EW (tau-fluvalinad 24%)	0,2 L na ha	insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode	- za zatiranje repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> , <i>C. piciparis</i>), repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>), redkvinega kljunotaja (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) in kapusove luske hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>)

PIRETROIDI TIPA II			
Decis 2,5 EC (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	dotikalni insekticid, s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in drugih škodljivcev
Decis 100 EC (deltametrin 10 %)	63 ml - 75 ml/ha	Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in za zatiranje repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)
Delux 050 CS (deltametrin 5 %)	0,1 l/ha	Tretiranje se opravi, ko je presežen prag škodljivosti	-za zatiranje repičarja (<i>Brassicogethes aeneus</i>) in stebelnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>)
Karate zeon 5 CS (lambda-cihalotrin 5%)	0,15 L na ha	dotikalni insekticid z želodčnim in odvrčnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.	-za zatiranje listnih uši (<i>Aphididae</i>), kljunotaja (<i>Ceutorhynchus</i> spp.) in repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) ter drugih grizočih žuželk
Poleci (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in drugih škodljivcev

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.

Datum objave obvestila: 20.02.2024 07:32
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: **Jože Miklavc**
[Seznam registriranih FFS](#)

