

6. VARSTVO MARELIC - 23.02.2024 14:15 - Zaključeno



Nasadi marelic imajo na večini leg že razprte cvetne brste, med tem ko na zgodnjih legah prehajajo v cvetenje (54 – 59).

Varstvo pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** lahko opravite preventivno s pripravki na osnovi bakra le še na poznih legah, kjer so brsti še v razpiranju. V poštev pridejo pripravki kot so: **BADGE WG** (3,5 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2,0 kg/ha) ali **CUPRABLAU Z 35 WP** (2,0 kg/ha). Poleg naštetih ima tudi v 2024 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe pripravek **CURATIO žvepleno apnena brozga** (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Kjer začenjajo marelice s cvetenjem, je v spremenljivem vremenu potrebno poskrbeti tudi za varstvo pred **cvetno monilijo**. Uporabite lahko: **AMYLO-X** (1,5 do 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje, oz. največ 3,3 l/ha), **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), **SWITCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha).

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 23.02.2024 14:15

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

