

## 7. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V OLJNI OGRŠČICI - 28.02.2024 07:52 - Zaključeno



## Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije po večini v razvojnih fazah pet listov razgrnjenih (15 po BBCH 15).

**Zatiranje škodljivcev kljunotajev (*Ceutorhynchus napi*, *Ceutorhynchus quadrienz*) in repičarja (*Meligethes aeneus*)**

Glede na visoke temperature smo rumene lovne posode za spremljanje ulovov kljunotajev v oljni ogrščici postavili v začetku februarja. V spodnji tabeli lahko spremljate ulov na naših lokacijah v okolici Krškega in Brežic. Priporočamo vam, da jih postavite tudi vi, odločite se lahko tudi za rumene lepljive plošče, pomembno je le, da redno spremljate ulov, najbolje na tri dni

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev na rumeno posodo v treh dneh. V primeru preseženega praga škodljivosti vam priporočamo njihovo zatiranje.

Rezultati pregledov rumenih lovilnih posod:

| Datum      | Št. hroščev repičnega kljunotaja Krško | Št. hroščev repičarja Krško | Št. hroščev repičnega kljunotaja Brežice | Št. hroščev repičarja Brežice |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 06.02.2024 | POSTAVITEV VABE                        |                             |                                          |                               |
| 20.02.2024 | 53                                     | 0                           |                                          |                               |
| 23.02.2024 |                                        |                             | POSTAVITEV VABE                          |                               |
| 27.02.2024 | 3                                      | 5                           |                                          |                               |

Trenutno so na voljo naslednji registrirani insekticidi za zatiranje kljunotajev:

| PRIPRAVEK        | ODMEREK    | št. dovoljenih tretiranj / | OPOMBE                              |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| DECIS 100 EC     | 0,075 L/ha | 1                          | za zmanjšanje populacije kljunotaja |
| DECIS 2,5 EC     | 0,3 L/ha   | 2                          |                                     |
| DELUX 050 CS     | 0,1 L/ha   | 1                          |                                     |
| EVURE            | 0,2 L/ha   | 1                          |                                     |
| KARATE ZEON 5 CS | 0,15 L/ha  | 2                          |                                     |
| MAVRIK 240 EW    | 0,2 L/ha   | 1                          |                                     |
| POLECI           | 0,3 L/ha   | 2                          |                                     |

\* Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti se na istem zemljišču se ne sme uporabljati sredstev, ki vsebujejo aktivno snov deltametrin oziroma sredstev iz skupine piretroidov več kot dva krat v eni rastni dobi.

**Kljunotaj** odlaga jajčeca v vrhnje dele stebela, ličinke se nato zavrtajo v notranjost. Steblo oslabi, se deformira in izgubi trdnost. Luski vezani na prizadeti del stebela se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo.

Hroščki **repičarja** se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo samo na način, da raztrgajo cvetove.

V sodelovanju s specialistko za poljedelstvo Matejo Strgulec iz Kmetijsko svetovalne službe na KGZS Novo mesto, bomo v letošnjem letu pripravili sklop kratkih poljedelskih nasvetov. Tokrat objavljamo drugega iz serije na temo varstva oljne ogrščice in ozimnih žit, skupaj s l. dognoevanjem žit. Vabljeni k ogledu: <https://www.youtube.com/watch?v=0PhEDs1rVNg>

**Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.**

