

6. Varstvo marelic - 04.03.2024 13:10 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Na izpostavljenih legah marelice prehajajo iz fenološke faze rdečega popka v fazo stadija balona do prvega odprtega cvetova (BBCH 57 – 59 – 60).

Glede na napoved toplega in nestanovitnega vremena opravite škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko bo odprtih 10 % cvetov. Uporabite enega od pripravkov, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Prolectus	330 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Revyona	1,8 L/ha
Signum	0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,6 WG	0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 L/ha
Amylo-X	1,5 do 2,5 kg/ha
Serenade ASO	8 L/ha
Prestop	0,2-0,4 % oz. 2 kg/ha

Pripravki na osnovi mikroorganizmov Amylo-X, Serenade ASO in Prestop imajo dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Drugo škropljenje opravite, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi.

Datum objave obvestila: 04.03.2024 13:10

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

