

7. Varstvo češenj, višenj, sliv in češpelj - 04.03.2024 13:12 - Zaključeno



Na sončnih in izpostavljenih legah zgodnje češnje, višnje, slive in češplje vstopajo v fenološko fazo brstenja. Spremljajte fenološki razvoj in ob vstop v fenološko fazo brstenje opravite škropljenje proti **listni luknjičavosti koščičarjev** in **rožičavosti/metličavosti češpelj** z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha – registriran tudi proti rožičavosti češpelj
Cuprablau Z 35 WG	1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Navedeni pripravki za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev dobro delujejo tudi proti rožičavosti češpelj.

Za zatiranje okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev je pridobilo dovoljenje za nujne primere sredstvo **CURATIO žvepleno apnena brozga**, ki se uporabi v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.

OPOZORILO: Sredstvo smejo uporabljati le poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo!

Datum objave obvestila: 04.03.2024 13:12

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

