

## 26. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 15.03.2024 15:19 - Zaključeno



Fenološke faze hrušk in jablan so na Primorskem zelo različne, odvisne od lege nasada in sorte. V Spodnji Vipavski dolini so hruške povečini v fazi brstenja oz. mišjega ušesa BBCH 53-54. Zgodnje sorte hrušk na toplih legah so povečini že v fazah od zelenega popka (BBCH 56), sorta Junijska lepota že začneja cveteti. Jablane so povečini v fazi mišjega ušesa (BBCH 54). Na najbolj toplih legah v Vipavski dolini je sorta Gala že v fazi BBCH 55, z oblikovano listno rozeto in vidnimi cvetnimi popki. Na višjih legah v Brkinih in na Tolminskem pa so še v fazi odpiranja brstov (BBCH 53), drugod v fazi mišjega ušesa (BBCH 54).

Ob zadnjih padavinah smo na objektih stekelcih zabeležili izbruh askospor, hkrati so bili izpolnjeni pogoji za močne okužbe s škrlupom. Ponoven izbruh askospor pričakujemo ob padavinah, ki so napovedane ob koncu tedna, zato priporočamo, da nasade pečkarjev pred napovedanimi padavinami ponovno preventivno poškropite s kontaktnimi fungicidi. V obdobju pred cvetenjem svetujemo uporabo pripravkov kot so Polyram v odmerku 2,0 kg/ha, Syllit 400 SC v odmerku 1,9 L/ha, Alcoban v odmerku 0,75 kg/ha ali pripravek Delan PRO v odmerku 2,5 L/ha.

V nasadih hrušk in jablan, ki še brstijo, je še čas za uporabo bakrenih pripravkov.

### Uporabite lahko:

| Sredstvo          | Odmereki, konc. |
|-------------------|-----------------|
| Cuprablau Z 35 WP | 3,0 kg/ha       |
| Cuprablau Z 35 WG | 3,0 kg/ha       |
| Cuprablau Z 50 WP | 2,0 kg/ha       |
| Kocide 2000       | 2 kg/ha         |
| Badge WG WG       | 2,9 kg/ha       |
| Nordox 75 WG      | 1,6 kg/ha       |

### Jablanov cvetožer (*Anthonomus pomorum*)

Zlasti na območju Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožera. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo na cvetovih. Velikost populacije škodljivca lahko ocenimo tudi s pregledovanjem brstov ter štetjem vbodov in odloženih jajčec. V nasadih s slabšim cvetnim nastavkom proti škodljivcu ukrepamo le v primeru, da smo pri pregledu ugotovili več kot 20% brstov z vbodi ali več kot 15% brstov z odloženimi jajčeci. V nasadih z obilnejšim cvetnim nastavkom je prag višji v obeh primerih za 10% višji.

Za zatiranje cvetožera lahko uporabite pripravek **ASET FIVE v odmerku 0,96 L** pri porabi vode največ 1500 L vode na ha. Priporočeni pH škropilne brozge je 5 do 6. Za doseganje ustreznega pH-ja škropilne brozge uporabite zakisevalce. Priporočeno je škropljenje v večernih urah, ker sredstvo fotolabilno. Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabite največ dvakrat.

Datum objave obvestila: 15.03.2024 15:19

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS

