



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Žita

/ 16. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH

16. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH - 19.03.2024 07:50 - Zaključeno



Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Ozimna žita so trenutno v razvojni fazi razraščanja (23 – 28 po lestvici BBCH).

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

Priporočamo, da pregledate posevke na **prisotnost plevelov**. Pri odločanju o najprimernejšem zaščitnem sredstvu, upoštevajte predvsem plevelno zastopanost, razvojne stopnje posevkov, terminov setve in vrste žita ter priporočene odmerke. Pri vsem skupaj pa je zelo pomembna kakovostna aplikacija (zadostna količina vode).

Pripravki označeni z * niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO. Na teh območjih priporočamo za zmanjševanje zapleveljenosti uporabo česal. Mehansko zatiranje plevelov je ena od metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. Spomladi razplevelimo z enoletnimi pleveli zmerno zapleveljene posevke. Predpogoj za uspeh so suha tla in zgodnje razvojne faze plevela. Ker je obema pogojema hkrati težko zadostiti, ostaja zatiranje plevelov z uporabo herbicidov še vedno pogost ukrep.

Za zatiranje plevelov v času razraščanja lahko uporabite naslednje pripravke:

- enoletni širokolistni pleveli: **GRODYL** (20-40 g/ha), **STOMP AQUA** (2,9 l/ha)
- enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli: **AXIAL ONE** (1 L/ha), **CORELLO DUO** (170 – 265 g/ha), **PALLAS 75 WG** (120-250g/ha)
- ozkolistni pleveli: **AXIAL** (0,6-0,9 L/ha)
- enoletni in večletni širokolistni pleveli, delno nekateri enoletni ozkolistni pleveli: **HERBOCID XL** (1,25 l/ha), **MUSTANG FORTE** (0,8 – 1 l/ha), **ESTERON** (0,75-1 l/ha), **SEKATOR OD** (0,15 L/ha), **XANADU** (0,1 kg/ha), **ALISTER NEW** (1 L/ha), **BATTERY*** (), **MUSTANG 306 SE** (0,4-0,6 l/ha), **LECTOR DELTA** (0,1 L/ha), **CLYDE FX** (1,5 L/ha), **FLUROSTAR SUPER** (), **VALENTIA** (1,2-1,6 L/ha) **QUELEX** (37,5 g/ha), **BIATHLON 4D*** (70 g/ha), **BONACA** (0,6 – 0,8 L/ha), **ELTIVIS** (0,6 - 0,8 L/ha), **FLUROSTAR 200** (0,75 – 1 L/ha), **STARANE FORTE** (0,54 L/ha), **HUSSAR OD** (0,1 L/ha), **HUSSAR STAR** (0,2 - 0,3 kg/ha), **ATLANTIS STAR** (0,20 – 0,333 kg/ha), **CLAP** (), **MAJOR 300 SL*** (0,3-0,4 L/ha), **EMCEE*** (1 l/ha), **U 46 M-fluid*** (1 l/ha), **DUPLOSAN KV*** (2 l/ha), **DUPLOSAN KV 600*** (1,5 l/ha), **ALLY SX** (30 g/ha), **FINY** (30 g/ha), **ALLIANCE** (65-100 g/ha), **BOUDHA** (20 g/ha), **ERGON** (70 g/ha), **FLUROSTAR FORTE** (), **FLYER** (), **FLAME** (30 g/ha),

Pri uporabi herbicidov v spomladanskem času bodite še posebej pozorni na vremenske pogoje in sicer upoštevajte dnevne in nočne temperature zraka. V času aplikacije naj bodo dnevne temperature vsaj med 8 – 10 °C, nočne pa nad lediščem.

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

Datum objave obvestila: 19.03.2024 07:50

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

Seznam registriranih FFS

