



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Oljna ogrščica

/ 17. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI

## 17. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI - 19.03.2024 07:51 - Zaključeno



### Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije na večini lokacij v fenološkem razvoju pojava internodijev (35 – 39 po BBCH) oz. na bolj zgodnjih legah v pojavu socvetja (50 – 55 po BBCH).

### Zatiranje škodljivcev repičarja (*Meligethes aeneus*) in repičnega kljunotaja (*Ceutorhynchus napi*)

Hroščki **repičarja** se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo samo na način, da raztrgajo cvetove.

Prag škodljivosti za repičarja je presežen, kadar imamo povprečno na posameznih rastlinah 1-2 hrošča v času razpiranja brstov (brsti zavarovani z lističi), ali kadar imamo 2-3 hrošče na rastlino v času nabreklih cvetnih brstov ali 4-6 hroščev na rastlino v času nekaj dni pred razcvetanjem prvih cvetov.

**Kljunotaj** odlaga jajčeca v vrhne dele stebela, ličinke se nato zavrtajo v notranjost. Steblo oslabi, se deformira in izgubi trdnost. Luski vezani na prizadeti del stebela se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo.

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev na rumeno posodo v treh dneh. V primeru preseženega praga škodljivosti priporočamo njihovo zatiranje.

Uporaba insekticidov je smiselna in smotrna le v primeru, da imate v svojih posevkih presežen prag škodljivosti, kar lahko preverite s postavitvijo rumenih lepljivih plošč ali rumeni lovnih posod.

Rezultati pregledov rumenih lovilnih posod:

| Datum      | Št. hroščev repičnega kljunotaja Krško | Št. hroščev repičarja Krško | Št. hroščev repičnega kljunotaja Brežice | Št. hroščev repičarja Brežice |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 06.02.2024 | POSTAVITEV VABE                        |                             |                                          |                               |
| 20.02.2024 | 53                                     | 0                           |                                          |                               |
| 23.02.2024 |                                        |                             | POSTAVITEV VABE                          |                               |
| 27.02.2024 | 3                                      | 5                           |                                          |                               |
| 05.03.2024 |                                        |                             |                                          | 8                             |
| 07.03.2024 | 0                                      |                             |                                          |                               |
| 12.03.2024 | 5                                      | 0                           |                                          |                               |
| 18.03.2024 | 5                                      | 19                          |                                          | 8                             |

Trenutno so na voljo naslednji registrirani insekticidi:

| PRIPRAVEK        | ODMEREK   | REPIČAR | KLJUNOTAJ | OPOMBE / št. dovoljenih tretiranj |
|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| DECIS 100 EC     | 63 ml/ha  | X       |           | K / 1                             |
| DECIS 2,5 EC     | 0,3 L/ha  | X       |           | K / 2                             |
| DELUX 050 CS     | 0,1 L/ha  | X       | X         | K / 1                             |
| EVURE            | 0,2 L/ha  | X       | X         | K / 1                             |
| KARATE ZEON 5 CS | 0,15 L/ha | X       | X         | K / 2                             |
| MAVRIK 240 EW    | 0,2 L/ha  | X       | X         | K / 1                             |
| POLECI           | 0,3 L/ha  | X       |           | K / 2                             |

K: kontaktni pripravek.

## Zatiranje glivičnih bolezni

S padavinami se bodo povečale tudi možnosti okužbe z glivičnimi boleznimi v oljni ogršči: suha trohnoba stebela ogrščice (*Phoma lingam*), bela zrnata gniloba (*Sclerotinia sclerotiorum*) in črna pegavost (*Alternaria brassicae* spp.).

Na podlagi vremenskih pogojev, zdravstvenega stanja posevka in fenološkega razvoja se odločite za uporabo enega od priporočenih pripravkov.

| SREDSTVO                                                                                                        | ODMEREK       | DELUJE NA                                                                               | PRIPOROČEN ČAS UPORABE                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FOLICUR EW 250</b><br><b>ORIOUS 25 EW</b>                                                                    | 1 L/ha        | Zatira: belo gnilobo<br><br>Zmanjšuje okužbo s: črno listno pegavostjo in suho trohnobo | Od začetka rasti stebela do konca cvetenja (BBCH 30 - 69).                                                              |
| <b>BOUNTY</b>                                                                                                   | 0,6 L/ha      | Zatira: belo gnilobo                                                                    | Od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60 - 65).                                                                 |
| <b>BUZZ ULTRA DF</b>                                                                                            | 0,33 kg/ha    | Zatira: belo gnilobo                                                                    | Od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60 - 65).                                                                 |
| <b>CARAMBA</b><br><b>PLEXEO</b><br><b>SIRENA</b>                                                                | 1,2 L/ha      | Zmanjšuje okužbe s: suho trohnobo                                                       | Od začetka rasti do začetka cvetenja posevka (BBCH 30 - 69)                                                             |
| <b>CHAMANE</b><br><b>NORIOS</b>                                                                                 | 1 L/ha        | Zatira: belo gnilobo<br><br>Zmanjšuje okužbe s: pegavostmi iz rodu <i>Alternaria</i>    | Ko je odprtih 10 % cvetov do konca cvetenja (BBCH 61 - 69)                                                              |
| <b>CUSTODIA</b>                                                                                                 | 1 L/ha        | Zmanjševanje okužb z: belo gnilobo                                                      | Ko je odprtih 10 % cvetov do polnega cvetenja (BBCH 61 - 65)                                                            |
| <b>MAVTA 250 EC</b><br><b>SCORE 250 EC</b>                                                                      | 0,5 L/ha      | Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost                                           | Od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69)                                                |
| <b>ORTIVA</b><br><b>TAZER 250 SC</b><br><b>ZAFTRA AZT 250 SC</b>                                                | 1 L/ha        | Zmanjšuje okužb s: črno listne pegavostjo, suho trohnobo in belo gnilobo                | Prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja (BBCH 60 - 69)                                                                   |
| <b>MIRADOR FORTE</b>                                                                                            | 1,5 do 2 L/ha | Zatira: črno listno pegavost, suho trohnobo in belo gnilobo                             | Od začetka rasti stebel do konca cvetenja (BBCH 30 - 69)                                                                |
| <b>PRAKTIS</b>                                                                                                  | 0,7 L/ha      | Zmanjševanje okužb: bela gniloba                                                        | od razvojne faze začetka rasti stebela do faze konca cvetenja (BBCH 30 - 69)                                            |
| <b>PECARI 300 EC</b><br><b>PROCER 300 EC</b><br><b>PROMINO 300 EC</b><br><b>ERA (staro ime TARTAROS 300 EC)</b> | 0,6 L/ha      | Zmanjšuje okužbe z: suho trohnobo, belo gnilobo                                         | od razvojne faze ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje, do konca cvetenja (BBCH 61-69) |

|                            |           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CACTAI<br/>TARTAROS</b> |           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROPULSE</b>            | 1 L/ha    | Zatira: suho trohno in črno listno<br>pegavost<br><br>Zmanjšuje okužbe z: belo gnilobo                     | Od 4 razvitega lista,<br>do faze, ko je 30%<br>luskov doseglo<br>končno velikost<br>(BBCH 14 - 73)                                                                                                            |
| <b>PROTENDO 300 EC</b>     | 0,6 L/ha  | Zmanjševanje okužb s: suho<br>trohno<br><br>Zmanjševanje okužb z: bela gniloba<br>ter črno listno pegavost | od razvojne faze<br>šest listov razvitih do<br>faze rumenega<br>brsta, ko so vidni prvi<br>venčni listi (BBCH<br>16-59)<br><br>od razvojne faze<br>začetka cvetenja do<br>faze konca cvetenja<br>(BBCH 61-69) |
| <b>REYONA</b>              | 1,5 L/ha  | Za zatiranje suhe trohnobe                                                                                 | Od tretjega lista<br>razgrnjenega, do<br>faze, ko so<br>individualni cvetni<br>brsti (glavno<br>socvetje) vidni,<br>vendar še vedno<br>zaprti (BBCH 13-55).                                                   |
| <b>ROYALTY</b>             | 0,5 kg/ha | Zmanjševanje okužb z: belo gnilobo<br>in črno listno pegavostjo                                            | od razvojne faze<br>pojava socvetja do<br>konca cvetenja<br>(BBCH 55-69)                                                                                                                                      |
| <b>SISAM</b>               | 0,8 L/ha  | Zatira: belo gnilobo                                                                                       | Ko so odprti prvi<br>cvetovi do konca<br>cvetenja<br><br>(BBCH 60 - 69)                                                                                                                                       |
| <b>VELOSTAR</b>            | 1 L/ha    | Za zmanjševanje okužb bele gnilobe<br>in črne listne pegavosti                                             | od začetka cvetenja,<br>ko so prvi cvetovi<br>odprti, do faze konca<br>cvetenja (BBCH 60-<br>69)                                                                                                              |
| <b>TEBUSH 25% EW</b>       | 1 L/ha    | Zatiranje: suhe trohnobe                                                                                   | od pojava cvetnih<br>popkov do polnega<br>cvetenja (BBCH 55-<br>65)                                                                                                                                           |
| <b>ZENBY</b>               | 0,8 L/ha  | Delno zmanjšuje okužbe: belo<br>gnilobo                                                                    | Polno cvetenje<br>(BBCH 60 – 65)                                                                                                                                                                              |
| <b>POLYVERSUM</b>          | 0,1 kg/ha | suha trohno zelja                                                                                          | 2. tretiranje: 9 ali več<br>podaljšanih<br>internodijev vidnih, do<br>faze polnega cvetenja<br>(BBCH 40-65).                                                                                                  |
|                            |           | bela gniloba                                                                                               | 2. tretiranje: spomladi,<br>od začetka rasti<br>stebela, do faze, ko je<br>9 ali več podaljšanih<br>internodijev vidnih<br>(BBCH 30-40),                                                                      |

|              |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       |                                         | 3. tretiranje spomladi: ko je 9 ali več podaljšanih internodijev vidnih, do faze polnega cvetenja (BBCH 40-65).<br><br>Če se tretira samo 2-krat, se prvo tretiranje opravi v fazi BBCH 30-40, drugo pa v fazi BBCH 40-65. |
|              |       | črna listna pegavost kapusnic           | ko sta 2 lista razvita, do faze polnega cvetenja (BBCH 12-65).<br><br>Intervali med tretiranjí naj bodo 10 dni.                                                                                                            |
| SERENADE ASO | 2 l/h | zmanjševanje okužb s koreninsko gnilobo | od prvih odprtih cvetov do konca cvetenja (BBCH 60-69)                                                                                                                                                                     |

Z zeleno barvo označeni pripravki so dovoljeni v ekološki pridelavi.

**Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.**

Datum objave obvestila: 19.03.2024 07:51  
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto  
Objavil/a: RODIČ Karmen  
Uredila: **Karmen Rodič**  
Seznam registriranih FFS

