

11. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 19.03.2024 13:53 - Zaključeno



Na lokacijah, kjer breskev prehajajo v fenološko fazo cvetenja BBCH 60 – 61, pred napovedanimi padavinami ob koncu tedna, opravite škropljenje proti **cvetni moniliji** z enim od pripravkov, ki so navedeni v preglednici. Ugodne pogoje za širjenje okužb v večjem obsegu ustvarja deževno in hladno vreme.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna experience	0,2 L na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,6 L/ha
Libreto	1 L/ha
Prolectus	330 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Revyona	1,8 L/ha
Signum	0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,6 WG	0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 L/ha
Amylo –X	1,5 – 2,5 kg/ha
Taegro	0,185 - 0,370 kg/ha

Pripravka na osnovi mikroorganizmov Amylo-X in Taegro imata dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

V primeru deževnega vremena v času polnega cvetenja je potrebno škropljenje proti cvetni moniliji ob koncu cvetenja ponoviti.

Datum objave obvestila: 19.03.2024 13:53

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Priprava: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

