

19. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.5 - 27.03.2024 13:32 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...) so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: odprti prvi cvetovi - okoli 10% cvetov odprtih (BBCH 60-61) po BBCH skali.

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili manjši izbruh askospor **jablanovega škrlupa**, vendar pogoji za okužbo z jablanovim škrlopom niso bili izpolnjeni. V primeru napovedanih obilnejših padavin lahko pričakujemo, da bodo izbruh askospor močnejši, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlop** priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan 700WG** - od razvojne faze rožnatih popkov, **Delan PRO**, **Alcoban**). **Uporaba aktivne snovi ditianon v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi.**

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od anilinopirimidinskih pripravkov: **Batalion 450 SC**, **Chorus 50 WG**, **Erune 40 SC**, **Laitane**, **Faban**, **Pyrus 400 SC**, **Pyramid**, **Pretil**, **Scala** ali **IBE** oz. SDHI pripravkov: **Difcor 250 EC**, **Difol**, **Duaxo koncentrat**, **Mavita 250 EC**, **Revyona** ali **Score 250EC** ali **Sercadis** ali **Sercadis plus**. Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku **Faban**.

V **ekološki pridelavi** je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Proti **jablanovi pepelovki** priporočamo pri **temperaturi nad 15°C** dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol disperss**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Sulfar**, **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG**.

Opozarjamo, da je v fenološki fazi cvetenje čas, da izobesite **feromonske pasti** za spremljanje jabolčnega zavijača. Sadjarji, ki ste se odločili za uporabo **metode zbeganja ali konfuzije** za zatiranje **jabolčnega zavijača**, je sedaj tudi čas za obešanje dispenzerjev: **RAK3**, **Isomate C TT**, **SemiosNET-Codling Moth** ali **Checkmate puffer CM-Pro**.

V kolikor še niste, je sedaj čas, da se v nasade jablan izobesijo bele lepljive plošče za spremljanje osic **jabolčne grizlice**. Prag škodljivosti je presežen, ko se na eno ploščo skupno ulovi 30 ali več osic. Po cvetenju jablan je potrebno bele lepljive plošče odstraniti, saj se na njih lovijo čebele in drugi koristni organizmi.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 27.03.2024 13:32

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

